

# Contributions à l'étude de la Faune

DES

## Microlépidoptères du Valais

par M. le révérend chanoine E. Favre.

---

M. le chanoine E. Favre s'est déjà fait un nom distingué dans l'entomologie par son catalogue des *Coléoptères du Valais* et celui des *Macrolépidoptères*. Ces catalogues ne sont pas une simple énumération systématique de noms d'espèces, ils renferment un grand nombre de diagnoses et dans le second, les noms spécifiques sont partout accompagnés d'observations consciencieuses sur la vie des chenilles et sur la distribution géographique de l'espèce dans les différentes parties du Valais.

C'est de la même manière sérieuse que M. le chanoine Favre a continué son travail en s'occupant des Microlépidoptères. Malheureusement l'auteur si actif est mort au milieu de son dernier travail ; cependant, il a laissé de précieux matériaux qui pourront être publiés comme contributions à la Faune des Microlépidoptères du Valais.

### I. PYRALIDÆ

#### A. Galleriinae

##### Gen. *Achroia*, Hb. 1818.

1. *Grisella*, F. E. S. III., 2 p. 289. *Alvearia* F. *Cinereola* Hb.

Chenille vivant dans les ruches d'abeilles. Pap. de mai en août. Rare, mais un peu partout. Dans le Haut-Valais (And.); Martigny, Sion, Sierre.

**Gen. Aphonía, Hb. 1818.**

1. **Sociella** L. S. N. X. p. 534 ♂. Colonella ♀ L. l. c.

Ch. vivant en société dans les nids des hyménoptères souterrains : guêpes, bourdons, etc. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Assez commun partout, plaine et région montagneuse. Mont Chemin, La Croix, Mont Ravoire, Branson, Sierre, Salquenen, Zermatt. *Obs.* Le ♂, tout différent de la ♀, est facilement pris pour une autre espèce.

**Gen. Galleria, Fab. 1798.**

1. **Mellonella** L. S. N. X. 527. Cerella F. Obliquella Wlk.

Ch. vivant sur la cire dans les ruches d'abeilles. Pap. au printemps, puis en juillet et août. Pas commun, mais un peu partout. Haut-Valais (And.); Martigny à la lumière, Fully, Vouvry, Sion, Sierre, etc.

**Gen. Lamoria, Wlk. 1863.**

1. **Anella** Schiff. S. V. p. 435. Sociella Hb.

Ch. vivant en société dans les nids d'hyménoptères souterrains : *Bombus terrestris*, etc., parfois sur quelques plantes basses : *Inula*, etc. Pap. en juillet. Partout rare et seulement dans la région chaude. Environs de Salquenen (de R.); près de Tourtemagne (Paul).

**B. Cambrinæ**

**Gen. Crambus, F. 1798.**

1. **Combinellus** Schiff. S. V. 390. Simploniellus Dup.

Ch. vivant dans les touffes de graminées. Pap. de juin en août. Pâturages de la région alpine. Sur le Simplon.

**Coulonellus** Dup X. 273.6. Tæniellus Z.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Pâturages de la région alpine, jusqu'à 2000 m. Loèche-les-bains (Bent.); Simplon, glacier de Trient. *Obs.* M. de Rougemont nous dit qu'il ne l'a jamais rencontré en Valais.

**Spuriellus** Hb. 471. *Pedriolellus* Dup. *Aridellus* H. S

Ch. dans les touffes du *Triticum*. Pap. en juillet et août. Assez rare. Région alpine jusqu'à 2000 m. et plus. Mont Rose; sur le Simplon.

**Inquinatellus** Schiff. S. V. 134. *Luteellus* Steph.

Ch. en juin et juillet sur *Barbula muralis*. Pap. en juillet et août. Assez rare. Endroits chauds et arides de la région inférieure. Martigny et environs (F.); Salquenen au réflecteur (de R.).

**Geniculeus** Hw. Lep. Br. 489. *Angulatellus* Dup.

Ch. inconnue. Pap. de juillet en septembre. Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (And.); près du château de la Bâtiaz (F.); Salquenen au réflecteur (de R.).

**Contaminellus** Hb. 59. *Cantiellus* Tutt. Ent. 1886, p. 52.

Ch. en mai et juin sur *Cirsium arvense*. Pap. de juillet en septembre. Assez rare. Dans les terrains secs et calcaires. Martigny.

**Deliellus** Hb. 402-3.

Ch. inconnue. Pap. de juillet en septembre. Très rare et localisé. Haut-Valais (And.); environs de Sion (Lah.).

**Lythargyrellus** Hb. 227. *Lithargyrellus* Tr.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans les lieux secs et sablonneux. Martigny, Branson, Fully, Mont Chemin, Salquenen, au-dessus de Zermatt.

**Tristellus** F. Mant. II. p. 243. *Aquilellus* Tr. Ailes antérieures d'un jaune paille, avec une grosse veine médiane argentée. La ♀ (beaucoup plus rare que le ♂)

a les ailes antérieures beaucoup plus étroites et plus pointues, ce qui lui donne un fasciès différent de celui du ♂.

Ch. en avril et mai dans les touffes de graminées. Pap. de juillet en septembre. Très variable et plus ou moins fréquent selon les années ; il vole surtout à la fin de l'été et vient au réflecteur. Plaine et sous-alpes jusqu'à 2000 m. près Martigny, Fully, La Forclaz, Trient, Bovine, Salquenen, Zermatt, Simplon, etc.

a) **ab. Culmella** Hb. 50. Bivitellus Klem. Ailes antérieures d'un jaune brunâtre ou basané, avec la veine médiane et 1-5 côtes plus ou moins argentées.

b) **ab. Paleella** Hb 51. Aquilellus Tr. l. c. v. 3. Ailes antérieures jaunes, avec la veine médiane nullement lavée et souvent une ligne foncée de la base au milieu du disque.

c) **ab. Fuscilinellus** Steph. Ill. III, p. 329. Ailes antérieures d'un brun foncé, avec une forte veine médiane.

d) **ab. Aquilella** Hb. 52. Ailes antérieures d'un brun foncé, unicolores, parfois avec 2-4 veines plus claires. Salquenen (de R.).

Toutes ces formes se rencontrent çà et là avec le type.

**Selasellus** Hb. 405-6. Pratellus H. S.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. Coteaux de la plaine et sous-alpes. Martigny, Mont Chemin, Salquenen. *Obs.* M. de Rougemont fait observer que Frey a tout à fait tort de ne vouloir y voir qu'une variation de *Tristellus* F.

**Luteellus** Schiff, S. V. 134. Exoletella Hb.

Ch. dans les touffes de *Festuca ovina*. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans les endroits chauds de la région inférieure. En Valais (Lah.) ; Martigny, Salquenen, Bois de Finges.



**Zermattensis** Frey, Mitth. III, (1870) p. 244, 478.

Ch. inconnue, probablement avec les mœurs communes aux autres espèces du genre. Pap. en juillet. Très rare et ne volant que dans les endroits rocailleux des plus hauts pâturages aux dernières limites de la végétation, entre 2500 et 3000 m. Augstbordpass, crête du Furwanghorn en 1903-1904 (de R.); près du Lac-Noir à Zermatt; sur le Simplon.

**Perlellus** Sc. Ent. Carn. n° 620. Argyreus Steph.

Ch. sous les pierres. Pap. de juillet en août. Plus ou moins fréquent selon les années et les localités; tout en appartenant surtout à la région moyenne, il monte cependant dans les Alpes. Mont Ravoire, Mont Chemin, Arpilles, La Forclaz, Trient, Bovine, Jeur-brûlée, Varenalp, Zermatt, Simplon, etc.

a) **ab. Warringtonellus** Stt. List. p. 2. Lithargyrellus Steph. Plus petit, avec les ailes antérieures très veinées de brunâtre.

Avec le type, mais plus rare. Haut-Valais (And.); Varenalp (de R.).

**Rostellus** Lah. Pyr. p. 55. Monochromellus H S.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Alpes du Valais (Lah.); Salquenen (de R.).

**Aureliellus** F. R. p. 281. Aurescellus F. R.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rarissime et seulement dans la région chaude, endroits plutôt marécageux. Aigle (Lah.); Vouvry (F.); Sierre (Paul); Salquenen au réflecteur (de R.).

**Saxonellus** Zk. Germ. Mag. IV, 255. Chrysellus Tr.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Pâturages des alpes. Sur le Simplon (Bent.). Var. Caren-tellus Chrét. (?)

**Fulgidellus** Hb. 365-6.

Ch. au printemps sur les *Carex*. Pap. en juillet et août. Très rare. Haute région alpine. A la Gemmi (Lah.); Zermatt (Frey); Riffelberg (F.).

**Radiellus** Hb. 325.

Ch. avec les mœurs de celles du genre. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans les Alpes, jusqu'à plus de 2000 m. La Forclaz, Arpillles, Bovine, Pierre à Voir, Gemmi, Zermatt, Simplon.

*Obs.* M. de Rougemont nous fait observer qu'il existe une grande confusion entre *C. Fulgidellus*, Hb., *C. Radiellus* et *C. Tristrigellus*, Ragonot. Il a trouvé, dit-il, dans les hauts pâturages du Valais, entre 1800 et 2400 m. des *Crambus* répondant exactement à la figure et à la description que Duponchel donne de *Radiellus* et *Fulgidellus* et à la description que Ragonot donne du *Tristrigellus*, mais les transitions qui relient ces trois formes les unes aux autres sont si insensibles et les papillons ont tellement les mêmes mœurs et le même habitat qu'il lui semble évident qu'il ne s'agit que d'aberrations d'une même espèce. Il croit avoir lu quelque part que le vrai *Fulgidellus* aurait les ailes inférieures franchement blanches. Dans ce cas, il n'existerait pas aux Alpes, ou, du moins, il ne l'y aurait jamais rencontré. Il nous resterait *Radiellus* et *Tristrigellus*; mais il lui semble difficile d'y voir deux espèces différentes à cause des formes intermédiaires. En tous cas, la différence entre ces deux formes est infiniment moins importante que celle qui existe entre *Luctiferellus* et *Luctuellus* ou entre *Pratellus* et *Nemorellus*. Il en conclut qu'il n'existe qu'une espèce de *Crambus* de ce groupe dans nos Alpes valaisannes (Ita de R.). Ce n'est pas notre avis : 1<sup>o</sup> *Fulgidellus* a les ailes inférieures grises (et non blanches); 2<sup>o</sup> *Radiellus* a ces mêmes ailes gris brun; 3<sup>o</sup> d'après Rebel : *Tristrigellus* est une aberration de *Radiellus* Hb. Voilà, selon nous, la vérité (Fav.).

- a) **ab. Tristrigellus** Ragonot. Ailés antérieures avec des lignes argentées dans les plis et la bordure interne.

Dans les hauts pâturages du Valais, entre 1800 et 2400 m. (de R.).

**Furcatellus** Zett. Ins. Lap. 995. Radiellus Curt. Radiolellus HS.

Ch. comme la précédente. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la haute région alpine. Gornergrat au-dessus de Zermatt (Frey).

**Margaritellus** Hb. 39.

Ch. comme celles du genre. Pap. en juillet et août. Dans les endroits frais, humides ou marécageux de la région montagneuse. Trient, La Forclaz, Mont Chemin, Salquenen, Simplon.

**Pyramidellus** Tr. IX, 1. 104.

Ch. comme les précédentes. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région montagneuse et sur les Alpes élevées. Près Val-d'Illiez (Lah.) ; au Lac-Noir près Zermatt (Frey) ; Mont Chemin, La Forclaz, Trient, Tétafayaz, Varenalp.

**Conchellus** Schiff. S. V. 134. Stenziellus Tr. Rhombellus Z.

Ch. dans la mousse des pierres et des vieux arbres. Pap. en juillet et août. Assez rare, mais en général nombreux là où il se trouve. Pâturages des régions moyenne et sous-alpine, jusqu'à 2000 m. Mont Ravoire, La Forclaz, Trient, Bovine, Mont Chemin. Salquenen, Zermatt, Simplon.

**Pinellus** L. S. N. X, 539. Pinetella Tr. Conchella Hb.

Ch. comme les autres du genre. Pap. en juillet et août. Rare et ne doit pas monter très haut. Dans le

Haut-Valais (And.); Mont Ravoire, La Forclaz, Trient, Mont Chemin, Bois de Finges.

**Mytilellus** Hb. 287.

Ch. comme les précédentes. Pap. de juin en août. Assez rare. Zermatt; Alpes des environs de Martigny et d'Anniviers; ? Salquenen (de R.).

**Myellus** Hb. 37. *Conchellus* Tr. *Hercyniæ* Hein.

Ch. dans la mousse des pierres. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans les bois secs et découverts et dans les pâturages montagneux, La Forclaz, Grimentz, Simplon.

**Speculalis** Hb. Verz, 365. *Pinetella* Hb. *Conchellus* Dup. (5<sup>a</sup>).

Ch. comme les précédentes. Pap. de fin mai en août. Pas très répandu, mais on en trouve plusieurs exemplaires à la même place, il vole à la lisière des forêts entre 1400 et 2000 m. Simplon, Zermatt, Riffelalp, Mont Chemin, Mont Ravoire, La Forclaz, Trient, Arpillen, Bovine, Zinal, etc.; en abondance à Gruben, à 100 m. au-dessus de l'hôtel, près du pont du ruisseau descendant de l'Augstbordpass (de R.).

- a) **ab. Müllerellus** de Rougemont, nov. ab. Même taille et même fasciès que le type, mais les ailes antérieures sont plus étroites, la couleur du fond moins sombre, la bande transversale médiane se rapproche davantage de la bande transversale apicale et les deux se réunissent en atteignant la bordure costale.

Un seul exemplaire pris à Grimentz en 1900 (de R.).  
*Obs.* Peut-être une espèce inédite.

**Luctiferellus** Hb. 324 ♀. *Luctuellus* H S. Très variable.

Ch. comme les précédentes. Pap. en juillet et août. Partout rare et localisé. Endroits rocaillieux des plus hauts pâturages, de 2300 à 3200 m. Sur le Simplon, de

Zermatt au Riffel et jusqu'au Gornergrat, Grimsel, environs du village de Trient, glacier de Moiry, sentier du Pas de Lona, sommet de la Bella-Tola, arête du Furwanghorn ; il volait en assez grand nombre en juillet 1904, le long de l'arête conduisant de la Gigialp au Furwanghorn (de R.).

*Obs.* M. de Rougemont a de la peine à admettre que *Luctiferellus* et *Luctuellus* appartiennent à la même espèce ; les différences sont si grandes que s'il n'existait pas des formes intermédiaires, il s'y refuserait absolument : chez l'un le blanc domine et l'autre est presque entièrement noir, et c'est surtout le dessous du papillon qui diffère d'une manière absolue. Il est vrai, par contre, qu'ils ont la même taille, même fasciés et même habitat (de R.). Une étude plus approfondie de la question pourrait peut-être la résoudre dans le sens d'une division de l'espèce (Fav.).

**Falsellus** Schiff. S. V. 134.

Ch. comme les précédentes. Pap. en juillet et août. Pas commun. Plaine et région montagneuse jusqu'à 1600 m. Simplon, Viège, Zermatt, Salquenen, Sierre, Sion, Martigny, Fully, Mont Chemin, Mont Ravoire, etc.

**Chrysonuchellus** Sc. Ent. Carn. n° 628. Campella Hb.

Ch. dans les touffes de *Festuca ovina*. Pap. de mai en juillet. Très commun, surtout dans les endroits humides et marécageux de la région inférieure ; ne monte pas très haut. Martigny, Fully, Salquenen.

**Craterellus** Sc. Ent. Carn. n° 627. Rorella L. Chrysonuchella Hb.

Ch. comme les précédentes. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Dans les prairies et les lieux secs et herbus. Haut-Valais (And.) ; Mont Chemin (F.).

**Lucellus** H S. 135. IV. p. 59.

Ch. comme les précédentes. Pap. de mai en juillet. Rarc et localisé. Endroits chauds de la région infé-

rieure et des sous-alpes. Sur le Simplon (Bent.); près Aigle (Lah.); plusieurs exemplaires dans un pré près de Salquenen en 1901-02 (M<sup>lle</sup> de R.). *Obs.* Ce pré ayant été défriché, il n'y a plus été vu depuis (de R.).

**Hortuellus** Hb. 46.

Ch. comme les précédentes. Pap. en juin et juillet. Assez commun. Plaine et sous-alpes. Martigny, Fully, Branson, Mont Chemin, Salquenen.

a) **ab. Cespitellus** Hb. 45! Hortuellus Dup. Ailes antérieures d'un paille clair, sans lignes foncées près des veines.

Plus rare et seulement dans la région chaude. Martigny, Branson, Salquenen.

**Culmellus** L. S. N. X, 535. Straminella Hb.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Pas très commun. Plaine et région montagneuse. Martigny, Fully, Mont Ravoire, Mont Chemin, La Forclaz, Trient, Salquenen au réflecteur, Zermatt, Simplon.

**Dumetellus** Hb. 389-390. Pratella Hb.

Ch. avec les mœurs du genre. Pap. de mai en juillet. Assez commun. Plaine et région montagneuse, jusqu'à 1800 m. Martigny, Mont Ravoire, Mont Chemin, Bovine, La Forclaz, Trient, Salquenen, Gruben.

**Palustrellus** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 78.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (And.); entre Bouveret et la Porte-du-Sex.

**Pratellus** L. S. N. X. 535. Angustellus Steph.

Ch. en automne dans les touffes de *Aira caespitosa*. Pap. de mai en août. Commun partout. Plaine et région montagneuse, dans les prairies et les lieux herbus, jusqu'à 2000 m. Simplon, Zermatt, Martigny, Mont Chemin, La Forclaz, Trient, Salquenen.

a) **ab. Obscurellus** Mn. z. b. V. 1871, p. 75. Plus petit, plus foncé.

Zermatt, jusqu'à 2300 m. (Frey).

- b) **var. Alfacarellus** Stt. e. Z. 1859 p. 221. Inconstant, le plus souvent avec une ligne lavée avant la marge aux ailes postérieures.

Avec le type, mais rare. Coteau des vignes au-dessus du château de la Bâtiaz.

**Nemorellus** Hb. 334. Lathoniellus Zk.

Ch. inconnue. Pap. de mai en août. Très rare. Région chaude inférieure. Quelques exemplaires de Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse.

**Silvellus** Hb. 369-370. Adippellus Tr.

Ch. avec les mœurs du genre. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans les prairies humides et marécageuses. Près de Sierre (Paul); Salquenen (de R.).

**Ericellus** Hb. 371.

Ch. comme la précédente. Pap. de juin en août. Rare. Dans les bruyères. Bois-Noir près de St-Maurice.

**Pascuellus** L. S. N. X, 535.

Ch. comme les précédentes. Pap. en juin et juillet. Pas rare et monte jusqu'à 2000 m. Région inférieure et pâturages montagneux. Zermatt, Salquenen, très commun à Gruben (1800 m.).

- a) **ab. Fumipallus** Mn. z. b. V. 1871 p. 75. Scirpellus Lah. Plus foncé.

Dans un endroit marécageux près d'Aigle (Lah.).

**Uliginosellus** Z. Bresl. Z. 1850 p. 34, t. 3, 8.

Ch. avec les mœurs du genre. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans les endroits frais et marécageux jusqu'à 1200 m. Loèche, Viège (Bent.).

**Malacellus** Dup. X, 270, 5 p. 61.

Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. Espèce méridionale qu'Anderegg signale dans le Haut-Valais.

**Gen. Platytes Gn. 1845.**

**Ceruseilus** Schiff. S. V. 135 n° 22 ♂. Quadrella l. c. n° 23 ♀.

Ch. inconnue, mais il est probable qu'elle vit dans les racines des mousses, des graminées et des cypéracées, comme la plupart des *Crambus*, où elles se construisent de longues galeries doublées de soie. Pap. en juin et juillet. Pas commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1700 m. Zermatt (Frey) ; Salquenen (de R.) ; Mont Chemin, Trient.

**Alpinellus** Hb. 338.

Ch. comme la précédente. Pap. en juillet et août. Pas rare, mais localisé. Dans la région des arbres à feuilles. Martigny, Charrat, Sion, Salquenen.

**Gen. Talis, Gn. 1845.**

1. **Quercella** Schiff. S. V. p. 134. Noctuella Hb. 33 ♂. Neglectella Hb. 457 ♀.

Ch. automne et printemps sur le chêne. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans les endroits chauds de la région du chêne. En Valais (And.) ; Martigny, Fully.

**C. Schœnobiinæ**

**Gen. Schœnobius, Dup. 1844.**

1. **Forficellus** Thnb. Diss. Ent. VII, p. 85. Consortella et Lanceolella Hb.



Ch. en mai dans le bas des tiges des *Carex*, *Poa aquatica* et *Arundo Phragmites*. Pap. en juin et juillet. Rare. Endroits marécageux. Port-Valais.

**Gen. Donacaula, Meyr. 1890.**

**1. Mucronellus** Schiff. S. V. 136. ♀ *Acuminella* Hb.

Ch. comme la précédente. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans les endroits marécageux de la plaine. Salquenen (de R.).

**D. Anerastinæ**

**Gen. Anerastia Hb. 1818.**

**1. Lotella** Hb. 334. *Miniosella* Zk. *Pulverella* Hb.

Ch. en mai sur les graminées. Pap. en juin. Très rare et probablement propre à la région chaude. Sur les bruyères. Au-dessus de Brigerberg ; pas rare à Salquenen, Bois de Finges.

*Obs.* D'après Frey ce serait la première mention certaine pour la Suisse (de R.).

**E. Phycitinæ**

**Gen. Homœosoma Curt. 1832.**

**Sinuella** F. E. S. III, 2, 308. *Gemina* Hw. *Elongella* Hb.

Ch. en avril et mai dans les tiges de *Chenopodium vulgare*. Pap. de mai en août. Assez commun dans la

région chaude des arbres à feuilles. Martigny, Branson, Sierre, Salquenen.

**Nebulella** Hb. 157.

Ch. en automne et au printemps dans les capitules du *Carduus nutans*, *Cirsium*, *Tanacetum vulgare*, *Linosyris vulgaris*. Pap. de mai en août. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (And.) ; environs de de Martigny ; Salquenen (de R.).

**Nimbella** Z. Is. 1839 p. 178. Caniusella Rag.

Ch. dans les fleurs de *Hieracium*, *Solidago*, *Carlina*, *Carduus nutans*, etc. Pap. en juin et juillet, puis août et septembre. Pas trop rare. Dans les lieux vagues, les pelouses sèches, les bruyères, les coteaux arides, les vieux murs, etc. Bois de Finges, Salquenen, etc.

**Binævella** Hb. 383. Petrella H S. Nebulella Wd.

Ch en mai et juin, puis en septembre et octobre sur les fleurs et dans les tiges de chardons. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Pas commun. Dans les lieux secs et sur les coteaux arides. Martigny, Branson, Salquenen.

**Gen. Plodia Gn. 1845.**

**1. Interpunctella** Hb. 310.

Ch. vivant de plantes, de fruits secs, de pain, dans l'intérieur des maisons. Pap. de mai en septembre. Pas commun. Haut-Valais (And.) ; Martigny, La Croix, Sion, Sierre, Salquenen.

**Gen. Ephestia Gn. 1845.**

**Tephrinella** Ld. An. S. Belg. 1870 p. 53. *Mediterranella* Mill.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare et seulement dans la région chaude. Environs de Sierre (Paul); en nombre à Salquenen en 1901 et 1904 (M<sup>lle</sup> de R.).

**Cantella** Wlk. List. XXVII. p. 73 (1863). Cahiritella Z.

Ch. sur les peupliers et le tremble. Pap. en été. Rare. Région chaude inférieure. Un seul exemplaire de Salquenen en 1901 (de R.). Nouveau pour la Suisse.

**Modestella** Ld. Wien. Mots. 1863 p. 43.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Coteau de Ravoire près Martigny.

**Elutella** Hb. 163. Rufa et Angusta Haw.

Ch. comme *Interpunctella*. Pap. de juin en août. Commun. Martigny, La Croix, Plan-Cerisier, Fully, Salquenen, etc.

### **Gen. Ancylosis Z. 1839.**

1. **Cinnamómella** Dup. X, 279, 4. p. 195. Dilutella Tr.

Ch. en automne et au printemps sur *Globularia vulgaris*, *Thymus*, *Artemisia campestris*, dans un fourreau à la surface du sol. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Assez commun, mais seulement dans la région chaude de la plaine et des sous-alpes. Mont Ravoire, Mont Chemin, Fully, Branson, Sion, Sierre, Salquenen, Viège, etc.

### **Gen. Psorosa Z. 1846.**

**Dahliella** Tr. IX, 1. 200. Bivittella et Bifasciata Dup.

Ch. inconnue. Pap. en mars, Rarissime. Région chaude inférieure. Un seul exemplaire de Salquenen en mars 1905 (de R.). Nouveau pour la Suisse.

**Gen. Pempelia Hb. 1818.**

**Subornatella** Dup. X, 284, 5 p. 287. *Serpylletorum* Z.

Ch. en avril et mai sur *Thymus* et *Globularia vulgaris*. Pap. de mai en août. Pas commun. Coteaux secs de la région inférieure. Mont Ravoire, Fully, Branson, Salquenen.

**Ornatella** Schiff. S. V. 319. *Criptella* Hb.

Ch. au printemps sur *Thymus serpyllum*. Pap. de juin en août. Assez rare, mais un peu partout dans les régions inférieure et moyenne. Mont Ravoire, Branson, Sion, Sierre, Salquenen, vallées d'Anniviers et de Tourtemagne, Zermatt, etc.

**Gen. Hyphantidium Scott. 1859.**

**(Cataremna Meyr.)**

**Terebrellum** Zk. Germ. Mag. III, 162.

Ch. en automne et au printemps dans les pommes de pin. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Coteaux secs de la région inférieure. Plan-Cerisier, Mont Ravoire.

**Gen. Euzophera Z. 1867.**

**Cinerosella** Z. Is. 1839 p. 176. *Artemisiella* S H. *Incanella* Ev.

Ch. inconnue. Pap. en..... Rare. Région chaude inférieure. Deux exemplaires de Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse.

**Fuliginosella** Hein 192. *Polyxenella* Mill.

Ch. de l'automne au printemps sur *Betula alba*. Pap. en juin. Très rare. Dans la région inférieure. Trois ex. au réflecteur à Salquenen (de R.). — Nouveau pour la Suisse.

**Gen. Eccopisa Z. 1848.**

1. **Effractella** Z. Is. 1848 p. 648.

Ch. inconnue. — Pap. de mai en juillet. — Pas commun. Région des arbres à feuilles. La Croix, Plan-Cerisier, Salquenen.

**Gen. Nyctegretis Z. 1848.**

1. **Achatinella** Hb. 451.

Ch. au printemps sur *Genista* et *Artemisia campestris*. — Pap. de juin en août. — Pas commun et seulement dans la région chaude. Branson, La Croix, Salquenen.

**Gen. Zophodia Hb. 1818.**

1. **Convolutella** Hb. 34. — Grossulariella Tr.

Ch. de mai en juillet sur les groseillers. — Pap. en mai et juin. — Rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (And.) ; Martigny, Mt-Chemin.

**Gen. Asarta Z. 1848.**

1. **Aethiopella** Dup. X, 284, 3 p. 283. Helveticella Z.

Ch. inconnue. — Pap. de juin en août. — Pas rare. Dans la région élevée des alpes. Furca, Zermatt, Riffelberg, glacier du Trient, Arpilles, Bovine, Varenalp, Grimentz, val de Tourtemagne, plateau du Simplon, etc.

**Alpicolella** Z. Is. 1839 p. 177.

Ch. inconnue. — Pap. de juin en août. — Rare. Dans la région alpine élevée. Sur le Simplon, Riffelberg, Bovine, glacier du Trient, Arpilles, Pierre à Voir. — *Obs.* M. de Rougemont observe que les nombreuses formes transitoires lui font douter de la différence spé-

cifique de ces deux espèces, à moins qu'il ne possède pas la vraie *Alpicolella* dont Duponchel ne donne pas la figure. Cependant Rébel n'hésite pas (F.).

**Gen. Hypochalcia Hb. 1818.**

**Lignella** Hb. 57 text p. 30. — *Melanella* Tr. — *Germarella* Dup.

Ch. en mars et avril dans les racines de *Bupleurum falcatum*, *Helianthemum vulgare*, y construisant des galeries. — Pap. en mai et juin. — Rare et plutôt dans la région chaude. Au-dessus de Plan-Cerisier, Stalden, Salquenen, etc.

**Ahenella** Hb. 58 text. p. 31. *Aeneella* Hb. *Bistrigella* Dup.

Ch. au printemps sur *Helianthemum vulgare* et *Artemisia campestris*. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région inférieure. Martigny, Branson, Sierre, Salquenen, Loèche et jusqu'à Zermatt.

**Gen. Etiella Z. 1846.**

**Zinckenella** Tr. IX. 4. 201. *Decipiens* Staud.

Ch. en août et septembre dans les siliques de *Spartium junceum*, *Robinia* et *Colutea arborescens*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans les régions inférieure et sous-alpine. Viège Sierre, Sion, Branson, Follatères, Mt Chemin, Stalden, Salquenen, etc.

**Gen. Bradyrrhoa Z. 1848.**

**Cantenerella** Dup. X, 284, 8 p. 347. — *Ravella* et *Chalcedonia* H. S.

Ch. sur *Cistus* et *Helianthemum*. — Pap. en juillet et août. — Rare. Dans les forêts de pins. Environs de Martigny (W.),

**Gen. Megasis Gn. 1848.**

**Ilignelal** Z. Is. 1839 p. 177. Laternella Ev.

Ch. inconnue. Pap. en juin et août. Rare et seulement dans la région chaude. Martigny, Fully, Sierre, Salquenen; Bois de Finges. 23 mai 1905 (M<sup>lle</sup> de R.).

**Rippertella** Z. Is. 1839 p. 177. Prodrumella Dup.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. C'est le plus grand de nos Micros; il vole sur les pentes rocheuses les plus brûlantes et n'a été trouvé en Suisse qu'au Valais: d'abord un ex. en juin 1900 dans les rochers de Fang (Anniviers); en mai 1902, M<sup>lle</sup> de Rougemont en découvrit une station riche dans une exposition pareille près du village de Salquenen où elle put en capturer un grand nombre dont 4 à 5 ♀ qui sont encore bien plus rares et recherchées que le ♂ (de R.); aussi à Viège Bent.); à Zermatt en juillet (Frey); au Bois de Finges et au M<sup>t</sup> Chemin.

**Gen. Epischnia (Hb. 1818)Z.**

**Prodromella** Hb. 254. Umbraticella Dup.

Ch. de septembre en mai suivant sur *Succisa pratensis* et *arvensis* et diverses *Centaurea*, à la surface du sol, sous les feuilles. Pap. de juin en août. Rare. Seulement dans la région chaude. Environs de Sierre (Paul); au-dessus du château de la Bâtiaz (F.); endroits arides et incultes des bords du Rhône sous Varone et à la lisière de la forêt au-dessus de Varone, sur un terrain sauvage et pierreux, exposé au soleil (M<sup>lle</sup> de R.).

**Boisduvaliella** Gn. An. S. Fr. 1845 p. 319. Farrella Curt. Lafauriella Const.

Ch. en mai sur les fleurs d'*Anthyllis vulneraria*. Pap. en juin et juillet. Rare. Région chaude inférieure. Viège (Bent.) ; Salquenen (de R.).

**Gen. Castatia Hb. 1818.**

**Marginea** Schiff. S. V. p. 69. Antiopella Zk.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. Coteaux chauds de la région inférieure. M<sup>t</sup> Ravoire.

a) **var. Auriciliella** Hb. 340. Plus petit, avec les franges des ailes antérieures jaunes.

Plutôt rare dans nos alpes. Bovine, Pierre à Voir, Varenalp, Simplon, etc. *Obs.* M. de Rougemont doute fort que *Auriciliella*, qui seule se trouve dans nos alpes, ne soit qu'une var. de *Marginea* qu'il a vue en Bavière et qui a un vol tout différent : lent et rappelant celui de certaines phryganides.

**Gen. Selagia (Hb. 1818) Z.**

**Spadicella** Hb. 225. (226 ♀). Janthinella Hb. 374-5.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les bois de chêne. Branson-Follatères, au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

**Argyrella** F. Mant. II. p. 242. Myella Hb. Orichalcella Sod.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et en août. Assez rare. Région inférieure des arbres à feuilles. Haut-Valais (And.) , Martigny, Fully, Salquenen.

**Gen. Salebria Z. 1846.**

**Betulae** Göze in Degeer Mém. I p. 98. Obtusella Zk.



Ch. en septembre jusqu'en avril suivant sur *Betula alba*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Ecône près Riddes.

**Palumbella** F. Mant. II. p. 245. Contubernella Hb.

Ch. de l'automne au printemps sur *Polygala Chamæbuxus*. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région alpine jusqu'à 2500 m. Alpes de Bex (Lah.); Gornergletscher près Zermatt (Bent.); La Forclaz (F.); Salquenen, dans une forêt de mélèzes (de R.).

**Formosa** Haw. Lep. Br. p. 494. Dubiella Dup.

Ch. sur le chêne. Pap. de juin en août. Rare et presque nouveau pour la Suisse. Quelques ex. de Salquenen, dont un ex larva (de R.).

**Thymiella** Z. Is. 1846 p. 763.

Ch. en juin sur le thym. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans la région des arbres à feuilles. Au-dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, Salquenen.

**Obductella** Z. Is. 1839 p. 179. Dilutella Dup. *Origanella* Schl.

Ch. de mai en septembre sur *Mentha arvensis*, *Origanum vulgare* et *Calamintha*. Pap. pendant toute la belle saison. Rare et plutôt dans la région chaude. En Valais (Dup.); au-dessus de Plan-Cerisier (F.); Salquenen (de R.).

**Fæcella** Z. Is. 1839 p. 179; 1846 p. 774.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région inférieure. Gamsen près Brigue (And.); Valais (Frey); Salquenen (de R.).

**Fusca** Haw. Lep. Br. 493. Carbonariella F. R. Janthinella Dup.

Ch. en printemps sur *Betula alba*. Pap. de juin en août. Pas rare et un peu partout dans les régions

forestière et alpine. Plateau du Simplon, Zermatt, Riffelalp, Findelen, Grimentz, Martigny, Brocard, La Forclaz, Trient; il vole en grand nombre dans une forêt de mélèzes et d'arolles au-dessus de Gruben, de 1800 à 2200 m. (de R.).

**Semirubella** Sc. Ent. Carn. N<sup>o</sup> 623. Carnella L.

Ch. en avril et en mai, puis en juillet et août sur *Lotus corniculatus* et sur les graminées. Pap. pendant toute la belle saison. Pas rare dans les endroits chauds de la région inférieure. Fully, Martigny, M<sup>t</sup> Ravoire, Sion, Sierre, Salquenén.

a) **var. Sanguinella** Hb. 65. Ailes antérieures avec la bandelette costale jaune.

Aussi commun que le type. Martigny, Fully, Sierre, Salquenén.

### **Gen. Nephopteryx (Hb. 1818) Z.**

**Genistella** Dup. X, 278, 4 p. 178. Ulicella H. S. Ch. en mai sur les genêts. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région forestière inférieure. Sur le coteau de Ravoire (W.).

**Rhenella** Zk. Germ. Mag. III, 166. Palumbella Hb.

Ch. de juillet en septembre sur les saules et les peupliers. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région inférieure. Martigny et ses environs.

### **Gen. Brepbia Hein 1865.**

**Compositella** Tr. X, 3. 171. Murinella et Senescens Hein.

Ch. en automne et au printemps dans une toile sur *Helianthemum vulgare* et *Artemisia campestris*. Pap. de mai en août. Pas commun. Dans la région inférieure. Martigny, Branson, Sierre, Salquenén, Viège, etc.

**Gen. Dioryctria Z. 1846.**

**Splendidella** HS. 43. IV. p. 79. Decuriella et Abietella Dup.

Ch. dans les cônes de *Pinus silvestris* et *Abies*. Pap. en juillet. Rare et isolé. Dans la région forestière. ? Valais (de R.).

**Abietella** F. M. p. 245. Decuriella Hb. Sylvestrella Ratz.

Ch. comme la précédente. Pap. de juillet en août. Rare. Dans la région des conifères. Martigny, M<sup>t</sup> Chemin, La Forclaz, Sierre, Salquenen.

**Gen. Phycita (Curt. 1840) Rag.**

**Metzneri** Z. Is. 1846 p. 742.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare. Région chaude des arbres à feuilles. Environs de Martigny (W.). Nouveau pour la Suisse.

**Spissicella** F. Gen. p. 295 Legatella et Cristella Steph.

Ch. en mai dans les feuilles roulées du chêne. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la région chaude des arbres à feuilles. Branson, au-dessus de Plan-Cerisier, Sion, Salquenen, Anniviers.

**Gen. Pterothrix Rag. 1888.**

**Rufella** Dup. X, p. 170. Crudella Z. Cruentella H. S.

Ch. au printemps sur les fleurs d'aubépine. Pap. en juillet et août. Assez rare. Dans la région chaude. Coteau de Ravoire près la Bâtiaz, Sierre, Salquenen, Rarogne.

a) **var. Lauridatella** HS. 22-3, IV p. 96. Plus foncé.

Abondant près Sierre et Rarogne dans le Haut-Valais (Lah.); coteau de Ravoire, Salquenen.

**Contectella** Z. Is. 1848 p. 661. *Xanthocephala* Staud.

Ch. au printemps sur *Cratægus*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région chaude inférieure. Branson, au-dessus de Plan-Cerisier.

### **Gen. Acrobasis Z. 1848.**

**Obtusella** Hb. 245.

Ch. au printemps sur *Pyrus communis*, *Prunus spinosa*, *Betula alba*, etc. Pap. en juillet et août. Assez rare. Région des arbres à feuilles, Follatères, Martigny, coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier (F. et W.); Salquenen au réflecteur et Bois de Finges, en juin 1905 (de R.).

**Tumidana** Schiff. S. V. p. 130. *Verrucella* Hb. *Rubrotibiella* F. R.

Ch. en mai sur le chêne, dans un tube de soie entre les feuilles. Pap. en juillet et août. Pas commun. Dans les taillis de chênes. Coteau de Ravoire près de Martigny, Branson.

**Zelleri** Rag. Monthl. Mag. XXII p. 28. *Tumidella* Zk.

Ch. au printemps sur le chêne. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région chaude des arbres à feuilles. Branson, Follatères, coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier.

**Bithynella** Z. Is. 1848 p. 611. *Obliterella* Staud.

Ch. inconnue. Pap. en mai. Très rare. Dans les lieux arides exposés au soleil. Haut-Valais (And.); coteau chaud de Ravoire près Martigny.

**Consociella** Hb. 328. *Tumidella* Dup.

Ch. au printemps sur le chêne. Pap. en juin et juillet. Assez commun dans les coteaux de la région inférieure. Fully, Branson, Martigny, Plan-Cerisier, Salquenen.

**Fallouella** Rag. Pet. Nouv. 1871 p. 147.

Ch. inconnue, mais probablement sur le chêne. Pap. en juillet et août. Rare et localisé. En battant les chênes dans le parasol par les Follatères près Branson et sur le coteau de Ravoire, dans cette dernière localité aussi la nuit butinant sur les fleurs des Centaurées.

### **Gen. Rhodophæa Gn. 1845.**

**Marmorea** Haw. 495. *Epelydella* Z.

Ch. inconnue, très probablement sur le chêne en mai et juin. Pap. en juin et juillet. Très rare et probablement propre à la région chaude. Un seul ex. de Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse.

**Legatella** Hb. 71.

Ch. en mai et juin sur divers *Rhamnus*. Pap. de juin en août. Rare. Endroits humides. Près Villeneuve (Rthb.); Bouveret, Port-Valais.

**Advenella** Zk. Germ. Mag. III, 141. *Rhenella* Steph. Consociella Dup.

Ch. en avril et mai sur *Sorbus Aria*, *Cratægus* et *Prunus spinosa*. Pap. de juin en août. Pas commun, plutôt dans la région chaude. La Croix de Martigny, Salquenen.

**Suavella** Zk. Germ. Mag. III, 140.

Ch. en avril et mai sur *Prunus spinosa* et *Cratægus*. Pap. de juin en août. Assez rare. Région chaude. Martigny, La Croix; pas rare à Salquenen (de R.).

**Gen. Myelois Hb. 1818.**

**Cribrella** Hb. 67. Cardui Hw. Cribrum Schrk.

Ch. d'août au printemps suivant dans les tiges de *Carduus*, *Cirsium*, *Echium*, *Inula*, etc. Pap. en juin. Assez rare et seulement dans les lieux incultes et arides de la région chaude. Plan-Cerisier, M<sup>t</sup> Ravoire, Branson, Sierre, Salquenen, Viège, etc.

**Tetricella** (S. V.) F. Mant. II, 246. Chrysorrhœa Zk.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Région chaude. Trois ex. de Salquenen (de R.). Nouveau pour la Suisse.

**Ceratonix** Z. Is. 1839 p. 176. Ceratoniella F. R. Zellerella Sorh.

Ch. d'août en avril suivant, dans les marrons, les châtaignes, etc. Pap. en juin et juillet. Pas commun. Région inférieure. La Croix, Fully, coteau de Ravoire.

**H. Endotrichinæ.**

**Gen. Endotricha Z. 1847.**

**Flammealis** Schiff. S. V. p. 123 ; Gn. 219.

Ch. en automne et au printemps sur les buissons de chênes. Pap. de juin en août. Assez commun. Dans les collines chaudes, rocheuses, couvertes de bois de chênes, sur les arbustes, etc. Au-dessus de Plan-Cerisier, Rossetan, Branson, Sierre, Salquenen, près de Viège.

## I. Pyralinæ.

### **Gen. Aglossa Latr. 1796.**

**Pinguinalis** L. S. N. X, 533 ; Gn. 127.

Chr. de mars en mai, elle vit de graines, de matières animales décomposées, etc. Pap. de mai en septembre. Pas rare dans toute la vallée du Rhône, dans les lieux secs et chauds, ordinairement appliqué contre les murs dans les maisons. Plaine et alpes. Martigny, La Croix, Mt-Chemin, Sierre, Salquenen, Lac Noir près Zermatt.

**Cuprealis** Hb. Verz. p. 348. Domalis Gn. Euthealis Hulst.

Ch. mêmes mœurs et époque que la précédente. Pap. de mai en septembre. Dans les endroits secs et chauds, appliqué contre les murs. Sierre (Paul). Nous ne l'avons jamais rencontré en Valais (F.).

### **Gen. Hypsopygia Hb. 1818.**

**Costalis** F. S. E. 132. Fimbrialis. S. V.

Ch. en automne et au printemps dans les feuilles pourries. Pap. de mai en juillet. Rare et localisé. Près de Vevey (Lap.) ; au-dessus de Plan-Cerisier (W.) ; Martigny-Ville dans un jardin (F.).

### **Gen. Pyralis L. 1767. (Asopia Tr. 1828).**

**Farinalis** L. S. N. X. Fraterna Butl.

Ch. en automne et au printemps, elle vit de son et de plantes sèches. Pap. de juin en septembre. Très commun partout. Plaine et région montagnaise, mais ne monte pas haut, dans les appartements, les sous-sols, les granges, etc., appliqué contre les murs, les

plafonds, etc. Environs de La Croix, Martigny, Mt Chemin, Trient, Fully, Sion, Sierre, Salquenen, Zermatt, Simplon, etc.

**Regalis** Schiff. S. V. p. 124. Princeps Butl. Pulchellalis Mill.

Ch. inconnue. Pap. de fin mai en août. Assez rare. Dans les bois-taillis et les endroits secs. Martigny, Rossetan, environs du château de la Bâtiaz, au-dessus de Plan-Cerisier, Branson, Granges, Lock près Sierre. *Obs.* Millière fait une espèce distincte de sa *Pulchellalis* et M. de Rougemont penche dans ce sens pour ses ex. de Stalden et de Salquenen.

### **Genr. Herculia Wlk. 1859.**

**Glaucinalis** L. S. N. X. 533. Nitidalis F.

Ch. en automne et au printemps dans les feuilles pourries. Pap. de juin en août. Rare. Dans les bois, les jardins et le voisinage des habitations. Environs de La Croix, Sierre, Salquenen au réflecteur.

**Rubidalis** Schiff. S. V. p. 124. Lucidalis Hb.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Dans les taillis de chêne. Follatères près Branson.

### **Gen. Cleodobia Steph. 1829.**

**Angustalis** Schiff. S. V. p. 120. — Erigalis F. Bombycalis Hb.

Ch. en avril et mai, polyphage sur les plantes basses; elle se tient sous les pierres dans des galeries formées de grains de sable, de terre et de soie. Pap. de juillet en septembre. Partout en été dans la vallée du Rhône, dans les bois et les lieux secs. Château de la Bâtiaz, coteau de Ravoire, Branson, Sierre, Salquenen, etc.



## K. Hydrocampinæ.

### **Gen. Nymphula Schrk. 1802 (Hydrocampa Gn).**

**Stagnata** Don. Nat. Hist. t. 3633. Potamogalis Hb.

Ch. en avril et mai sur *Nymphæa alba*, plus ou moins immergée sous les feuilles, mais dans un fourreau composé de deux morceaux de la feuille nourricière et elle se chrysalide dans ce même fourreau. Pap. de juin en septembre. Rare. Sur les bords des mares où croissent le *Nymphæa* et le *Potamogeton natans*, dans les endroits marécageux de la plaine. Port-Valais ; plaine de Fully près du pont de Branson (W.).

**Nymphæata** L. S. N. X, 529. Potamogalis Tr.

Ch. même époque, mêmes mœurs et sur les mêmes plantes que la précédente. Pap. de juin en septembre. Pas commun. Endroits marécageux de la plaine. Haut-Valais (de R.).

**Stratiotata** L. S. N. X, 529. Stratiotalis Schiff.

Ch. en mars et avril sur diverses plantes aquatiques. Pap. de juin en septembre. Rare. Dans les endroits marécageux de la région inférieure. Environs de Salquenen (de R.).

### **Gen. Cataclysta Hb. 1818.**

**Lemnata** L. S. N. X, 529. Lemnalis Schiff. Uliginata F.

Ch. au printemps sur *Lemna* et *Scirpus*. Pap. de mai en août. Rare. Dans les marécages de la plaine et des sous-alpes. Haut-Valais (And.) ; environs de Salquenen (de R.).

**Gen. Stenia Gn. 1844 (Amaurophanes Led.)**

**Punetalis** Schiff. S. V. 123. Aetnaealis Dup. Longepedalis Curt.

Ch. sur les fleurs de *Salvia* dont elle mange les étamines de préférence. Pap. de juin en septembre. Assez rare et surtout dans la région chaude, dans les endroits secs et herbus. Environs du château de la Bâtiaz (W.); Salquenen au réflecteur (de R.).

**Gen. Perinephila Hb. 1818.**

**Lancealis** Schiff. S. V. 121. Glabralis Hb. Longalis Hw.

Ch. de juillet en septembre sur *Eupatorium cannabinum*, *Senecio*, *Sium latifolium*, *Stachys silvatica*. Pap. de mai en juillet. Très rare, localisé et seulement dans la région chaude, au bord des ruisseaux. Stalden près Viège, Salquenen (de R.).

**Gen. Psammotis Hb. 1818.**

**Pulveralis** Hb. 109 ; Gn. 401.

Ch. en avril et mai sur *Mentha aquatica* Pap. de juin en août. Rare. Dans les lieux marécageux de la plaine. Aigle, Vouvry, Sion.

**Hyalinalis** Hbr. 74 ; Gn. 336.

Ch. en avril et mai sur *Urtica dioica* et sur les tiges fleuries du *Verbascum Thapsus* (de R.). Pap. de juin en août. Pas rare. Dans les coteaux de la région inférieure. La Croix, au dessus de Plan-Cerisier, La Forclaz, Branson, Bramois, Salquenen, etc.

**Gen. Eurrhypara Hb. 1810.**

**Urticata** L. F. S. 1297. Urticalis Hb. Hortulata Snell.

Ch. sur les orties, les groseillers, la pariétaire, les liserons, etc. ; elle hiverne dans les tiges sèches. Pap. de mai en juillet. Assez répandu partout où croissent les orties, surtout dans la région inférieure. Martigny, La Croix, M<sup>t</sup> Chemin, Branson, Fully, Sion, Sierre, Salquenen, etc.

**L. Scopariinæ.**

**Gen. Scoparia Hw. 1803.**

**Centuriella** Schiff. S. V. 319. Borealis Lef. Centurialis Gn.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare et seulement dans la région montagneuse jusqu'à 2000 m. ; il vole dans les pierriers recouverts de buissons de genévriers, petits saules et rhododendrons. Près de St-Nicolas (Jäg.) ; M<sup>t</sup> Chemin, Trient, sur le Simplon, alpe de Gruben en 1904 (de R.).

**Zelleri** Wck. Jhrb. Schles. Ges 1854 p. 18.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région forestière inférieure, contre les troncs, les rochers, etc. Le long du sentier entre Martigny et le Gottra.

**Cembræ** Hw. Lep. Br. 498. Cembralis Gn. Asphodiella Lah.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare et seulement dans la haute région alpine. Alpes valaisannes (Lah.) ; glacier du Trient, Pierre à Voir, Simplon.

**Ambigualis** Tr. VII, 184. — **Dubitalis** Steph. — *Conicella* et *Ancipitella* Lah.

Ch. en avril et mai sur la mousse des arbres et des rochers. — Pap. de mai en juillet. — Assez répandu et un peu partout dans la plaine et jusqu'à 1600 m. dans la montagne. Martigny, La Croix, Mt Chemin, La Forclaz, Branson, Sierre, Grimentz, Zermatt, Simplon, etc.

**Ingratella** Z. L. E. I. p. 283. — *Ingratalis* Gn. 422.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Région montagneuse, contre les rochers, les troncs, etc. Entre la Forclaz et le glacier du Trient, Mt Chemin.

**Dubitalis** Hb. 49. *Pyralella* Hb. *Ingratella* Kn.

Ch. en avril et mai sur la mousse du chêne et du hêtre. Pap. de mai en juillet. Assez commun, presque partout dans la région inférieure. Martigny, La Croix, Mt Chemin, Ravoire, Branson, Sierre, Salquenen, Gruben, Viège, Brigue.

**Valesialis** Dup. VIII, 229, 3 p. 284. *Parella* Z.

Ch. en mars sur la mousse des rochers. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Dans les pierriers dénudés de la haute région alpine, jusqu'à 3000 m. Bovine, La Forclaz, alpe de Tracuit (2900 m.), pointe d'Orzival, col de Sorebois, Augstbordpass, etc.

a) **ab. Imparella** Z. Is. 1839 p. 175. Plus petit, plus clair, sans points avant le milieu.

Çà et là avec le type. En Valais (And.).

b) **ab. Octonella** Lah. Suppl. p. 42. Plus grand, plus clair, avec la partie centrale des ailes antérieures noirâtre.

Avec le type, mais rare.

**Petrophila** Stdfs, Stt. e. Z. 1848 p. 312.

Ch. probablement sur la mousse des rochers et des arbres. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région montagneuse jusqu'à 1600 m., contre les rochers et contre les troncs. Zermatt (Frey).

**Sudetica** Z. Is. 1839 p. 175. Sudeticalis Dup.

Ch. de mars en mai sur la mousse des arbres et des rochers. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la région forestière montagneuse jusqu'à 2000 m. En Valais (Frey); Mt Chemin, Pierre à Voir, Bovine, Sierre, Gri-mentz, Gruben, etc.

a) **var. Luzialis** Gn. 427. Plus foncé et très différemment marqué.

Dans les mêmes localités que le type, mais plus rare. Pied du Mt Chemin, Pierre à Voir, Grimentz.

**Murana** Curt. B. E. IV, 170. Muralis Gn. Parella HS.

Ch. comme la précédente. Pap. de juin en août. Commun partout, dans la plaine comme dans la montagne. Martigny, Mt Ravoire, La Forclaz, Mt Chemin, Fully, Champéry dans la vallée d'Illiez, La Furka; Zinal, Gruben.

**Lætella** Z. L. E. 1, 298. Lætalis Gn. 427.

Ch. de mars en mai dans la mousse des vieux arbres et des rochers. Pap. de juin en juillet. Rare. Région inférieure. Mt Chemin par le sentier du Gottra (W.); Salquenen (de R.).

**Truncicolella** Stt. Cat. 2. Mercurialis Gn. Pallida Bnks.

Ch. de février en avril dans la mousse des pierres et des murs. Pap. de mai en août. Rare. Dans la région des forêts et jusque dans la plaine. En Valais (And.); Mt Chemin par le sentier du Gottra (W.).

**Cratægella** Hb. Tin. 231. Cratægalis Gn. 428.

Ch. en mars et avril, puis en août et septembre dans un tube de soie sous la mousse des arbres. Pap. en mai et juin, puis en juillet et août. Assez commun partout. Régions inférieure et moyenne. Martigny, La Croix, Mt Chemin, Mt Ravoire.

**Frequentella** Stt. Man. 2, 162. Cratægella HS. Mercurella Steph.

Ch. au printemps dans la mousse des arbres et des rochers. Pap. en juillet et août. Rare. Région forestière. Le long du sentier du Gottra sur le Mt Chemin (W.); La Forclaz (Seeb.): Salquenen (de R.).

**Pallida** Steph. Jll. IV, 300. Pallidulalis Gn. 430.

Ch. en août et septembre dans les endroits tourbeux et marécageux. Pap. de mai en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. En Valais (And.); Sierre (Paul)

## M. Pyraustinæ.

### **Gen. Agrotera Schrk. 1798.**

**Nemoralis** Sc. Ent. Carn. n° 618. Erosalis F.

Ch. en automne sur *Castanea vulgaris*, *Quercus*, *Betula*. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Région des arbres à feuilles. La Croix, au-dessus de Plan-Cerisier.

### **Gen. Sylepta Hb. 1818.**

**Ruralis** Sc. Ent. Carn. n° 616. Verticalis Schiff.

Ch. au printemps sur *Urtica dioica* et *urens*. Pap. en juin et juillet. Commun partout dans la région des arbres à feuilles. Martigny, La Croix, Mt Ravoire, Branson, Sion, Sierre, Salquenen, etc.

### **Gen. Orenaia Dup. 1831 (Hercyna T. pr. p.)**

**Lugubralis** Ld. Wien. Mots. 1857 p. 82. Conspurcalis Lah.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare. Dans les hautes alpes, sur les croupes rocailleuses exposées au soleil. Haut-Valais (And.).

**Helveticalis** H S. 127-8, VI p. 141. Assez semblable au précédent, cependant plus blanc en dessous, avec la bande antémarginale et la tache médiane des ailes antérieures plus foncées.

Ch. et Chrys. sous les pierres. Pap. en juillet et août. Très rare et toujours isolé sur les croupes rocailleuses et exposées au soleil dans les alpes élevées. Gornergrat (Frey); col de Sorebois, Pas de Lona, val de Gruben (de R.).

**Rupestrialis** Hb. 201-3. *Andereggialis* H S.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare. Dans la haute région alpine, jusqu'à 2500 m. Alpes du Haut-Valais (And.); alpe de Bovine (W.).

**Alpestralis** F. E. S. 350. *Alpina* Hb. Vög. 21.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les hauts pâturages de la région alpine, de 2000 à 2600 m. Pierre à Voir, Bovine, Pas de Lona, Chandolin, au-dessus de Zermatt, Riffelberg, Simplon, etc.

### **Gen. Evergestis Hb. 1818 (*Orobena* Gn.).**

**Sophialis** F. Mant. II p. 217. *Variegalis* F. l. c. 218.

Ch. sur *Galium Mollugo* entre les racines et les tiges rampantes (de R.) et sur *Sisymbrium Sophia*, *Rubia tinctorum*. Pap. de mai en juillet. Assez rare et monte assez haut; on le trouve en général appliqué contre les rochers en compagnie de diverses *Cidaria*. Plaine et région montagneuse jusqu'à 2000 m. près. Zermatt, Simplon, Trient, Mt Chemin, La Croix, Plan-Cerisier, Branson, Grimentz, Salquenen; M. de Rougemont ne l'a rencontré nulle part aussi fréquent que près de Zermatt, au pied des rochers au N.-O. et à l'O. du village.

**Extimalis** Sc. Ent. Carn. N<sup>o</sup> 614. *Margaritalis* Schiff. *Erucalis* Hb.

Ch. en avril et mai, puis en août sur *Alyssum*, *Brassica*, *Thlaspi*, *Sisymbrium*, *Iberis*, *Diplotaxis*, etc. Pap. en juin et juillet, puis d'août en octobre. Pas rare en Valais (Lah.); Sion, Sierre (Paul).

**Politalis** Schiff. S. V. p. 121; Gn. 372.

Ch. inconnue. Pap. en août et septembre. Rare et assez localisé. Dans la région chaude inférieure. Salquenen (de R.).

**Limbata** L. S. N. XII, 873. *Prætextalis* Hb. *Limbalis* Gn.

Ch. sur *Genista tinctoria* dans un nid de soie blanche, en quantité sur la même plante. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans les lieux chauds et herbus de la région forestière, Martigny, M<sup>t</sup> Chemin, près du Gottra (F.).

**Ænealis** Schiff. S. V. 123. *Furvalis* et *Rufimitralis* Hb.

Ch. en avril et mai sur les Crucifères. Pap. en juin et juillet. Rare et localisé. Dans les environs de Viège (M.-D.); plusieurs ex. à Loèche en juin 1904 (de R.).

### **Gen. *Nomophila* Hb. 1818.**

**Noctuella** Schiff. S. V. 136. *Hybridalis* Hb.

Ch. en automne et au printemps, dans les lieux secs et sablonneux, au centre des touffes de graminées où elle se métamorphose. Pap. de juin en septembre. Commun partout dans la région inférieure et les sous-alpes, mais pas chaque année; lorsqu'il est fréquent il vient en grand nombre au réflecteur. Environs de Martigny, M<sup>t</sup> Chemin, M<sup>t</sup> Ravoire, Charrat, Branson, Sion, Sierre, Salquenen; en masse à Riffelalp, fin juillet 1902 (F.).



**Gen. Phlyctænodes Hb. 1818. (Eurycreon Ld.)**

**Palealis** Schiff. S. V. 123.

Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur les ombelles de *Peucedanum oreoselinum* et *Daucus Carota*. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare et isolé. Dans les endroits chauds de la région inférieure. Branson, La Croix, au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen, etc.

**Verticalis** L. S. N. x. 533. Cinctalis Tr. Limbalis Hb.

Ch. de mai en juillet sur *Cirsium arvense*, etc. Pap. en juillet et août. Pas rare. Endroits chauds et herbus. Sierre, Viège, Martigny, coteau de Ravoire, La Croix, Follatères près Branson.

**Turbidalis** Tr. VII, 119. Flagellalis Dup. Gilvalis Hb.

Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur *Artemisia campestris*. Pap. en mai et juin, puis en juillet et août. Très rare. Haut-Valais (And.).

**Virescalis** Gn. 383. Clathralis Dup.

Ch. en été et automne sur *Artemisia campestris*; elle se tient cachée dans un tissu de soie blanche près de l'extrémité des rameaux. Adulte dès le mois d'août, elle descend à terre et se tisse à la surface du sol un long fourreau fortement parcheminé, recouvert extérieurement de toutes sortes de débris : mousse, terre, petites pierres, feuilles sèches, etc., mais parfaitement lisse et soyeux à l'intérieur. La chenille passe l'automne et l'hiver dans cette longue gaine pour ne s'y transformer en chrysalide qu'au printemps et éclore peu de semaines après. La chrys. ressemble à celle d'une *Sesia* et est si transparente qu'on peut déterminer le papillon avant même son éclosion. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Dans les lieux les plus chauds de la région inférieure. Collines de Fully, Branson, coteau de Ravoire, Sion, Sierre, Salquenen, Viège, Gamsen, etc.

**Stieticalis** L. F. S. N<sup>ro</sup> 1356. Fuscalis Hb.

Ch. en juin, puis en octobre sur *Artemisia campestris*. Pap. en mai, puis en juillet et août. Pas rare. Dans les endroits chauds de la région inférieure. Martigny, coteau de Ravoire, Branson, Grimentz, etc.

**Gen. Diasemia Gn. 1854.**

**Litterata** Sc. Ent. Carn. N<sup>ro</sup> 574. Litteralis Hb.

Ch. Dans les touffes de graminées. Pap. en mai, puis en juillet et août. Pas rare. Dans les lieux secs et sablonneux de la région inférieure d'où il monte jusqu'à 2400 m. La Croix, Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, Branson, Bovine, Mt Chemin, Pierre à Voir, Salquenen, etc.

**Gen. Mecyna Gn. 1854.**

**Polygonalis** Hb. Vög. 76. Rusticalis Hb.

Ch. en automne et au printemps sur *Genista Spartium*, *Polygonum*, etc. Pap. de mai en août. Très rare. Coteaux chauds de la région inférieure. En Valais. (Lah.) ; Mt Ravoire.

**Gen. Cynæda Hb. 1818. (Odontia Dup).**

**Dentalis** Schiff. S. V. p. 120. Radiata Esp.

Ch. en avril et en mai sur *Echium vulgare* et *Onosma echioides*. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans les endroits chauds de la plaine ; il ne s'élève guère dans les vallées latérales. Martigny, Fully, château de la Bâtiaz, Plan-Cerisier, Saillon, Sion, Sierre, Salquenen, Loèche, etc.

**Gen. Titanio Hb. 1818.**

**Pollinalis** Schiff. S. V. p. 124. Bigutta Esp.

Ch. de mars en mai, puis en juin et juillet sur *Genista*, *Cytisus* et *Ononis spinosa*. Pap. en mai et

juin, puis en août et septembre. Assez rare, mais partout dans les régions inférieure et moyenne. Martigny, Mt Ravoire, La Forclaz, Salquenen, etc.

**Pyrenæalis** Dup. Suppl. IV, 82, 6 p. 600. Simplonialis HS.

Ch. et Chrys. sous les pierres. Pap. en août et septembre. Rare et localisé, mais volant en assez grande abondance là où il se trouve. Toujours sur les plus hauts cols des alpes, près des neiges éternelles, entre 2600 et 3000 m. Alpes au-dessus de Brigue, Haut-Vallais (And.); Riffel, sommet du Gornergrat (Frey); col d'Orzival, Pas de Lona, Varenalp (de R.).

**Schrankiana** Hoh. Btr. VI p. 336. Holosericalis Hb. Lugubrina Esp.

Ch. (et chrys. dans son cocon) sous les pierres en juillet et août. Pap. de mai en juillet. Assez commun dans les sous-alpes et dans les alpes, de 1400 à 2000 m. Mt Chemin, Bovine, Arpilles, glacier du Trient, Pierre à Voir, Zinal, Chandolin, Riffelalp, Findelen, Gornergrat, Ganter, Rothwald, plateau du Simplon, etc.

**Phrygialis** Hb. 42. Rupicolalis Hb. Monedula Esp.

Ch. et cocon de la Chrys. sous les pierres. Pap. de mai en juillet. Comme le précédent et encore plus abondant là où il vole, mais semble descendre moins bas et monter plus haut. Mt Rose, Arpilles, Bovine, Pierre à Voir, Zinal, Pas de Lona, Chandolin, Ganter, Bérisal, plateau du Simplon, Riffelalp, Gornergrat, etc.

### **Gn. Pionea Gn. 1854. (Botys Hb.).**

**Pandalis** Hb. Verz. 355. Angustalis Hw. Oblitalis. Dup.

Ch. en avril et mai, puis en juillet, polyphage sur les plantes basses. Pap. toute la belle saison. Commun

partout, plaine et région montagneuse. Martigny, La Croix, coteau de Ravoire, Branson, Fully, Salquenen, Simplon, etc.

**Institalis** Hb. 182 ; Gn. 393.

Ch. en mai et juin sur *Cirsium lanceolatum*, etc. Pap. en juin et juillet. Très rare et seulement dans la région chaude Haut-Valais (And.) ; Fully, Sion.

**Crocealis** Hb. 71. Ochrealis Hb. 146.

Ch. en avril, puis en juin entre les feuilles de *Senecio*, *Centaurea Scabiosa*, *Helianthemum*, etc. Pap. en mai, puis en août. Assez abondant jusqu'à 1200 m. La Croix, M<sup>t</sup> Chemin, château de la Bâtiaz, coteau de Ravoire, Branson, etc.

**Fulvalis** Hb. 147 ; Gn. 396.

Ch. en mai et juin sur *Salvia pratensis*. Pap. de juin en août. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny (W.).

**Ferrugalis** Hb. 54, 150. Testacea Butl.

Ch. en automne, puis en juillet et août sur *Aster Amellus*, *Eupatorium*, *Stachys*, etc. Pap. toute la belle saison. Assez rare. Coteaux de la région inférieure jusqu'à 1000 m. Château de la Bâtiaz, coteau de Ravoire, La Croix, Plan-Cerisier, etc.

**Elutalis** Schiff. S. V. 121. Ablidalis Hb.

Ch. en mai sur *Artemisia campestris* et *Ægopodium Podagraria*. Pap. de juin en août. Assez rare. Coteau de la région inférieure. Château de la Bâtiaz, M<sup>t</sup> Ravoire, Branson, Loèche-les-Bains, Viège, etc.

**Prunalis** Schiff. S. V. 121. Leucophæalis Hb.

Ch. en mai et juin, polyphage sur plantes basses : *Aquilegia vulgaris*, etc. Pap. de juin en août. Assez commun. Région des arbres à feuilles jusqu'à 1000 m. Martigny, La Bâtiaz, La Croix, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen, Ganter, etc.

**Inquinatalis** Z. Is. 1846 p. 205. Glacialis Pack.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région forestière à 1900 m. environ. En Valais (Paul); quatre beaux ex. en juillet 1904, pas loin de l'hôtel de Gruben, dans la vallée de Tourtemagne (de R.).

**Stachydalis** Zk. Germ. F. I. E. IV, t. 18.

Ch. en septembre sur les *Stachys*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Coteaux herbus de la région inférieure jusqu'à 1000 m. Fully, Martigny, La Croix, au-dessus de Plan-Cerisier, Rossetan, château de la Bâtiaz, coteau de Ravoire, etc.

**Verbascalis** Schiff. S. V. 121. Arcualis Hb.

Ch. en mai sur *Teucrium*, *Verbascum Thapsus*, etc. Pap. de juin en août. Pas commun. Dans la région des arbres à feuilles. La Croix, au-dessus de Plan-Cerisier, Château de la Bâtiaz, Branson, Lax, Salquenen, Viège, etc.

**Forficalis** L. S. N. X, p. 533. Sodalis Butl.

Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur les crucifères et surtout sur le chou cultivé. Pap. en mai, puis en juillet et août. Commun partout. Plaine et sous-alpes. Martigny, coteau de Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Fully, Sion, Sierre, Salquenen, etc.

**Lutealis** Hb. 145. Institalis Steph. Pascualis Z.

Ch. en avril et mai sur *Tussilago Farfara*. Pap. de juin en août, selon l'altitude. Pas commun en général; plaine et région montagneuse jusqu'à 1600 m.; il volait cependant en grande abondance, fin juin et commencement de juillet 1900 en dessus de Grimentz, entre le village et la petite chapelle où l'on prend le sentier pour Mission (de R.); Arpilles, Trient, Evolène, au-dessus de Zermatt, Simplon, etc.

**Nebulalis** Hb. 51. Pinetalis et Pratalis Z.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Assez rare. Région montagneuse jusqu'à près de 2000 m.; cepen-

dant très commun dans les buissons de genévriers des pentes sèches de la vallée de Tourtemagne, entre 1600 et 2000 m. (de R.); La Forclaz, Mt Chemin, Pierre à Voir, Grimentz, Stalden, Zermatt, Simplon, etc.

**Decrepitalis** Hs. 67-8, IV, p. 40; Gn. 399.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Région alpine. Alpes des environs de Martigny, Grimentz. Un ex. à Binn en juillet 1905 (de R.).

**Olivalis** Schiff. S. V. 123. Umbralis Hb.

Ch. sur les plantes basses : *Urtica*, *Veronica*, *Lychnis*, *Lonicera*, etc. Pap. en juillet. Assez rare et localisé. Pâturages sous-alpins. Au-dessus de Zermatt, Mt Chemin.

### **Gen. Pyrausta. Schrk. 1802 (Botys aut.).**

**Cilialis** Hb. 119. Venosalis Nolk. Virgatalis Chr. Virgata Reut.

Ch. en août sur les graminées dans les lieux marécageux. Pap. de mai en juillet. Rare. Marais de la plaine. Aigle, Vouvry (F.); près marécageux de Martigny (W.).

**Terrealis** Tr. VIII, 110. Humilalis Ld.

Ch. de l'automne en juin sur *Solidago Virgaurea*, *Aster Amellus*, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Assez commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. La Croix, Plan-Cerisier, La Forclaz, Mt Chemin, Viège, Zermatt, Simplon, etc.

**Fuscalis** Schiff. S. V. 121. Cinerealis Hb. Fimbrialis Steph.

Ch. sur *Lathyrus pratensis*, *Polygonum Bistorta*, *Solidago*, *Rhinanthus Crista-galli*, etc. Pap. toute la belle saison. Pas rare. Plaine et sous-alpes. Martigny, Mt Chemin, Pierre à Voir, Loèche, etc.

**Sambucalis** Schiff. S. V. 121; Gn. 364.

Ch. en juin, puis en septembre sur *Sambucus*, *Convolvulus*, etc. Pap. en avril et mai, puis en juillet. Assez rare. Coteaux de la région inférieure jusqu'à 1000 m. Martigny, au pied du M<sup>t</sup> d'Autan, Fully, Sierre, Salquenen, etc.

**Repandalis** Schiff. S. V. 120. Pallidalis Tr.

Ch. en automne et printemps sur *Verbascum Thapsus*. Pap. de juin en août. Pas commun et seulement dans la région chaude. Fully, Martigny, M<sup>t</sup> Ravoire, Plan-Cerisier, Salquenen, Bois de Finges, etc.

**Flavalis** Schiff. S. V. 121; Gn. 334.

Ch. sur *Galium Mollugo* entre les racines et les tiges rampantes. Pap. en juin et juillet. Pas commun et ne monte pas très haut. Dans les pâturages secs et les coteaux arides sur sol calcaire. Branson, Fully, Plan-Cerisier, M<sup>t</sup> Ravoire, Salquenen, Viège, Simplon, etc.

- a) **var. Lutealis** Dup. VIII, p. 331. Citralis HS.  
Plus foncé, avec le dessus des ailes presque sans dessins.

Plus commun que le type en Valais. Vignes de Martigny, Fully, Saillon, Vétroz, Sion, Gamsen.

**Paludalis** de Rougemont, nov. sp.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare et seulement dans la région chaude. Un seul ex. dans les prés humides de Salquenen (M<sup>lle</sup> de R.). Voici ce qu'en dit M. de Rougemont : Il se distingue du *Flavalis*, 1<sup>o</sup> par sa taille notablement plus petite et son abdomen beaucoup plus long, ce qui lui donne tout à fait le faciès du *B. Pandalis*; 2<sup>o</sup> par la teinte plus pâle, moins fournie d'écailles; 3<sup>o</sup> il porte un petit anneau, plus ou moins distinct selon les individus, en dessous de la tache orbiculaire des ailes antérieures, ce qui le fait ressembler tout à fait à la figure que Duponchel

donne du *B. Trinalis* (Pl. 218 f. 6.); 4<sup>o</sup> la ligne transversale des ailes postérieures est sensiblement moins coudée que chez *Flavalis*; les franges grises (comme chez ce dernier) sont séparées de l'aile par un fin liséré noirâtre; 6<sup>o</sup> *Flavalis* a toujours l'extrémité des ailes postérieures fortement ombrée de gris, ce qui n'est jamais le cas chez *Paludalis*; 7<sup>o</sup> enfin cette espèce vole dans les prés humides et marécageux, tandis que *Flavalis* et sa var. *Lutealis* aiment les collines chaudes et rocheuses. M. de Rougemont avait remarqué ce *Botys* pour la première fois en Bavière où il en prit un très grand nombre d'ex., tous de même taille et volant sur une prairie tourbeuse.

**Nubilalis** Hb. 94 ♂. *Silacealis* Hb. 116 ♀.

Ch. en automne et au printemps dans les tiges du houblon, du maïs et de plusieurs graminées. Pap. de mai en juillet. Assez rare et localisé. Dans les endroits herbus, humides et marécageux Environs de Salquenen près Sierre (de R.).

Obs. M<sup>lle</sup> de Rougemont l'a pris au réflecteur.

**Asinalis** Hb. 185. *Characteralis* Frr.

Ch. en automne sur *Rubia*, *Galium Aparine* et autres plantes. Pap. de mai en août. Rare et seulement dans la région chaude. Sion, Sierre, Loèche, Viège.

**Ærealis** Hb. 44; Gn. 179.

Ch. polyphage sur plantes basses : *Gnaphalium*, etc. Pap. en juin, puis en août. Assez commun. Alpes et sous-alpes. M<sup>t</sup> Chemin, M<sup>t</sup> Ravoire, Trient, Bovine, Jeur-brûlée, Pierre à Voir.

a) **var. Opacalis** Hb. 169-170. *Suffusalis* Tr. Plus grand, plus foncé, avec la bande des ailes antér. plus claire et plus éloignée du bord.

Plus commun que le type et dans les mêmes localités. M<sup>t</sup> Rose, M<sup>t</sup> Chemin, Grimentz.

**Murinalis** F. R. 92, 3 p. 276; Gn. 389.



Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Très rare. Dans la région alpine jusqu'à 2000 m. Hautes Alpes du Valais (And.); sur le Simplon (F.).

**Uliginosalis** Steph. Cat. II, 166. *Monticolalis* Lah. *Alpinalis* Steph.

Ch. en mai et juin sur graminées et autres plantes basses. Pap. de juin en août. Pas rare. Hauts pâturages de la région alpine. Alpes du Valais (Frey); Pierre à Voir, Bovine, Grimentz, près du glacier de Moiry en très grand nombre, Zinal, Zermatt, Findelen, Riffelalp, Simplon, etc.

**Alpinalis** Schiff. S. V. 123; Gn. 390.

Ch. en avril, puis en juin sur *Senecio*, *Stachys*, *Leontodon*, etc. Pap. en juin, puis en août. Très rare. Région alpine jusqu'à 2000 m. et plus. Bovine, glacier de Trient, Arpillen, Pierre à Voir, Furka; bien au-dessus de l'hôtel de Gruben.

**Rhododendronalis** Dup. VIII, 235, 5 p. 363.

Ch. inconnue; il est même très peu probable qu'elle vive sur le rhododendron. Pap. de juin en août. Assez répandu et cependant seulement dans la région du rhododendron. Pierre à Voir, alpe de Fully, Pas de Lona, Zermatt, Riffelalp, Simplon, St-Bernard, Furka, etc.

**Manualis** Hb. 195-7; Gn. 156.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Région alpine. Haut-Valais (And.); alpes du Valais (R. S.); Zermatt, peu au-dessus du village (de R.).

**Cespitalis** Schiff. S. V. 123. *Sordidalis* Hb. *Tendinosalis* Brem.

Ch. en avril et mai, puis en juin et juillet sur *Plantago* et *Salvia*. Pap. en mai et juin, puis en août. Commun partout déjà dès la fin d'avril dans la région chaude, s'élevant assez haut sans atteindre cependant

la région des hautes Alpes et devenant de plus en plus rare à mesure que l'on monte. Martigny, Fully, Mt Chemin, Mt Ravoire, Bovine, Trient, Sierre, Salquenen, etc.

**Sanguinalis** L. S. N. XII, 882.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre sur *Thymus serpyllum*. Pap. en mai et juin, puis en juillet et août. Pas rare. Dans les endroits arides et les plus chauds. Martigny, Château de la Bâtiaz, Branson, Sierre, Salquenen, Viège, Stalden, Naters.

- a) **var. Hæmatalis** Hb. 178 (gen. æst.) Partie extérieure largement jaune pur, tache sanguine médiane divisée en deux; ailes postérieures jaunâtre clair.

Avec le type.

- b) **var. Virginalis** Dup. VIII, 224, 3. Plus grand, bande médiane bien plus large, coupée de jaune en dedans, la partie jaune extérieure se réduit à une ligne; ailes postér. d'un gris foncé.

Haut-Valais (And.).

**Porphyralis** Schiff. S. V. 317. *Coccinalis* Hb. *Chionealis* Gn.

Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur *Origanum*, *Thymus*, *Stachys* et *Mentha*. Pap. en juin, puis en juillet et août. Pas commun. Coteaux et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Martigny, Mt Chemin, Mt Ravoire, Trient, Branson, Fully, Jeur-brûlée, Sierre, Bois de Finges, Zinal, Salquenen.

**Purpuralis** L. S. N. X. 534. *Punicealis* Hb.

Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur *Mentha arvensis* et *Plantago major*. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Fully, Martigny, Rossetan, Mt Ravoire, Sierre, Salquenen, Ganter.

- a) **var. Chermesinalis** Gn. 107. *Purpuralis* Dup. (gen. æst.). Plus grand, couleur purpurine plus claire, avec la bande médiane des ailes infér. plus large.

Plus rare et seulement dans les Alpes élevées. Bovine, glacier de Trient, Pierre à Voir, Simplon.

- b) **var. Ostrinalis** Hb. 113. *Modestalis* Dup. Bien plus foncé, souvent plus petit, avec les taches couleur de soufre pâle.

Dans les mêmes localités que le type, mais plus rare.

**Aurata** Sc. Ent. Carn. N<sup>ro</sup> 565. *Punicealis* Tr. *Porphyralis* Hb.

Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur *Mentha aquatica*. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. Trient, Arpilles, Martigny, M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Branson, Grimentz, Zinal, Salquenen, Simplon.

**Fascialis** Hb. 31.

Ch. inconnue. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région sous-alpine. Haut-Valais (And.); M<sup>t</sup> Chemin.

**Nigrata** Sc. Ent. Carn. N<sup>ro</sup> 580. *Anguinalis* Hb.

Ch. en juin, puis en septembre sur *Thymus* et *Salvia*. Pap. en mai, puis en juillet. Pas rare dans les endroits chauds et herbus de la région inférieure, jusqu'à 1300 m. Martigny, coteau de Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Branson, Jeur-brûlée, Granges, Salquenen, Loèche.

**Cingulata** L. S. N. X, 529. *Cingulalis* Hb. *Fascialis* Dup.

Ch. en juin, puis en septembre sur *Salvia glutinosa* et *pratensis*. Pap. en mai, puis en juillet et août. Pas rare. Collines chaudes de la région inférieure. Martigny, coteau de Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Branson, Sierre, Bois de Finges, Salquenen.

a) **var. Vittalis** Lah. N. Denksch. XX, page 33.  
Plus grand que le type.

Seulement dans la région alpine. La Forclaz, hôtel de la Pierre à Voir (Séeb.); forêt de Tête-Noire, fin juin 1905 (F.).

**Albofascialis** Tr. VII, 196; X, 3, 42; Gn. 183.

Ch. sur *Conyza squarrosa*. Pap. en juin. Rare. Haut-Valais (And.).

**Nigralis** F. E. S. 421; Gn. 183.

Ch. en août et septembre sur *Salvia glutinosa*, *Clinopodium vulgare* et *Salvia pratensis*. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Région chaude et sous-alpes jusqu'à 1800 m. Haut-Valais (And.); M<sup>t</sup> Chemin, M<sup>t</sup> Ravoire, Arpillles, Salquenen, Stalden.

**Nyctemeralis** Hb. 148. Intricalis Ev.

Ch. en mai sur *Vaccinium Myrtillus*. Pap. en juin et juillet. Plaine et coteaux de la région inférieure. Haut-Valais (And.); M<sup>t</sup> Chemin.

**Funebri** Ström. K. Norsk. Vid. Skr. IV, 339. Octomaculata L. Guttalis S. V.

Ch. de juillet en septembre sur *Genista*. Pap. pendant toute la belle saison. Pas rare, sans être commun nulle part. Coteaux de la région sous-alpine jusqu'à 1400 m. Haut-Valais (And.); vignes de Martigny, M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Jeur-brûlée au-dessus de Branson, au pied du M<sup>t</sup> d'Autan, Niouc, Salquenen; forêt de Tête-Noire en quantité; sous le village de la Crettaz (F.).

a) **ab. Trigutta** Esp. (Noct.) IV, t. 163. Avec un point blanc au milieu des ailes antérieures.

En Valais (And.); coteau de Ravoire.

### **Gen. Heliothela Gn. 1854.**

1. **Atralis** Hb. 27; Gn. 152.

Ch. sur *Mentha silvestris*. Pap. pendant toute la belle saison. Très rare. Sous-alpes et alpes jusqu'à 2000 m. environ. M<sup>t</sup> Ravoire, Salquenen.

## II. PTEROPHORIDÆ.

### Gen. *Oxyptibus* Z. 1841.

**Tristis** Z. Is. 1841, 788.

Ch. en avril et mai, puis en juillet sur *Hieracium alpinum* et *Pilosella*, *Knautia arvensis* et *Pyrethrum corymbosum*. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Assez rare. Plaine et région sous-alpine. Martigny, coteau de Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Distans** Z. Is. 1847, 902.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet, se reposant volontiers sur *Ononis spinosa*. Pas rare. Coteaux de la plaine et jusqu'à plus de 2000 m. dans les Alpes. Près de Cran de Lens, Maienwand.

**Pilosellæ** Z. Is. 1841, 789, t. 4. 27.

Ch. en mai et juin sur *Hieracium Pilosella* au cœur des pousses. Pap. de juin en août. Très rare. Coteaux de la plaine et sous-alpes. M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Bois de Finges.

Obs. M. de Rougemont est étonné que Frey, dans la description de ce papillon, ne mentionne pas les épaulettes blanches recouvrant presque le thorax, ce qui semblerait pourtant être le trait caractéristique des papillons de Finges.

**Hieracii** Z. Is. 1841, 827, t. 4, 5, 20-24.

Ch. en mai et juin sur *Hieracium umbellatum*, *Picris hieracioides*, au cœur des pousses dont il ramasse les feuilles pour son nid. Pap. de juin en août. Rare, plutôt dans la région chaude. Haut-Valais (And.); Sion, Sierre, Salquenen.

**Eriectorum** Z. L. E. VI, 352.

Ch. en avril et mai, puis en juillet sur *Hieracium Pilosella*. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (And.); environs de La Croix, Sierre.

**Didactylus** L. F. S. N<sup>ro</sup> 1453. *Trichodactylus* Hb. *Brunneodactylus* Mill.

Ch. d'avril en juin sur les fleurs de *Geum rivale* et de *Veronica officinalis*. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (And.); coteau de Lenz, Grimentz.

**Teuerii** Jord. Monthl. Mag. VI, 1869 p. 14. *Hieracii* Greening.

Ch. en mai et juin sur *Teucrium*. Pap. en juillet et août. Rare. Coteaux de la plaine et des sous-alpes. M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Parvidactylus** Hw. Lep. Br. 480. *Obscurus* Z.

Ch. en avril et mai, puis en août et septembre sur *Hieracium Pilosella*, *Stachys alpina*, *Marrubium*. Pap. pendant toute la belle saison. Pas très rare et volant plutôt dans l'herbe des hauts pâturages de 1600 à 2000 m. Haut-Valais (And.); environs de La Croix, Sierre, Grimentz.

### **Gen. *Platyptilia* Hb. 1818.**

**Rhododaetyla** F. E. S. III, 2, 347, 7.

Ch. d'avril en juin sur *Rosa canina* et sur les rosiers des jardins, d'abord sur les pousses et plus tard en nids dans les rameaux. Pap. de juin en août. Très rare. Dans la région inférieure. Martigny, M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Ochrodaetyla** Hb. 12, 13. *Pallidaetyla* Hw.

Ch. de mai en juillet sur *Achillea ptarmica*, *Tanacetum vulgare*, *Galium Mollugo*, d'abord dans les pousses et ensuite dans les tiges. Pap. en juillet et août. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Martigny, M<sup>t</sup> Chemin.

**Isodaetyla** Z. L. E. VI, 328. *Monodaetyla* Hw.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare et localisé. Dans les clairières où croissent les *Calluna*, *Vaccinium*, et *Anemone sulfurea*, A Gruben, dans la forêt

de Meiden, en face de l'hôtel, un peu en aval, s'élevant depuis le bord de la rivière jusqu'à 2000 m. et plus; deux ex. près de Salquenen en juin 1905. Nouveau pour la Suisse (de R.).

**Gonodactyla** Schiff. S. V. 320. Megadactyla Hb.

Ch. d'avril en juin sur *Tussilago Farfara* et *Petasites* sur les tiges fleuries. De juin en août. Rare. Vallée de Tourtemagne (Mus. gen.); dans un vallon près de Binn, en nombre (de R.).

**Zetterstedtii** Z. Is. 1841, 777. t. 4 f. 3, 4. Tessera-dactyla Z.

Ch. sur les tiges de divers *Senecio*. Pap. en juin et juillet. Rare; plutôt dans la région chaude. Valais, probablement de Salquenen (de R.).

**Metzneri** Z. Is. 1841 p. 783. Bollii Frey.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Très rare. Dans la région alpine. Maienwand (Boll.); Grimsel (Lah.) M<sup>t</sup> Chemin, La Forclaz.

**Acanthodactyla** Hb. 23-24. Calodactyla F.

Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur les fleurs de *Pelargonium* dans les jardins, sur *Ononis spinosa* et *repens*, *Stachys*, *Euphrasia*, *Origanum*, etc. Pap. d'avril en juin, puis en septembre et octobre. Très rare. Dans la région inférieure et les sous-alpes. Martigny, M<sup>t</sup> Chemin.

**Cosmodactyla** Hb. 35-36. Punctidactyla Hw. Ulo-dactyla Zett.

Ch. en juin et juillet sur *Aquilegia vulgaris* et *Stachys*, sur les fleurs et dans les graines. Pap. en août. Pas rare. Plaine et sous-alpes. Martigny, M<sup>t</sup> Chemin.

**Gen. Alucita (L. 1758) Wlsghm. (Aciptilia Hb.)**

**Galactodactyla Hb.**

Ch. en mai et juin sur *Lappa* en société près des nervures sous les feuilles. Pap. de juin en août. Rare. Région chaude. Haut-Valais (And.); Martigny, Fully.

**Pentadactyla L. S. N. X, 542.**

Ch. de septembre en mai suivant sur *Convolvulus arvensis* et *sepium*, *Trifolium*, etc. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Haut-Valais (And.); environs de La Croix, Salquenen,

**Xanthodactyla Fr. IX, 2, 251. Galactodactylus Dup.**

Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur *Jurinea*<sup>1)</sup> et autres plantes basses, sous les feuilles; elle se chrysalide sur la plante même. Pap. toute la belle saison. Rare. Région montagneuse. M<sup>t</sup> Chemin.

**Baliodactyla Z. Is. 1841, 861. Tridactylus Steph.**

Ch. en mai et juin sur *Origanum vulgare*. Pap. de juin en août. Rare; plutôt dans la région chaude. Haut-Valais (And.); au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

a/ **var. Meridionalis** Staud. Hor. XV, p. 432. Plus petit et plus pâle.

Avec le type, dans le Haut-Valais (And.); coteau de Ravoire.

**Tetradactyla L. S. N. X, 542. Leucodactyla Hb.**

Ch. en mai et juin sur *Thymus serpyllum*, sur les feuilles basales de la plante. Pap. de juillet en septembre. Pas rare. Plaine et alpes jusqu'à 2000 m. Haut-Valais (And.); La Forclaz, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen, Gruben.

**Malacodactyla Z. Is. 1847, 905.**

---

<sup>1)</sup> Les *Jurinea* sont étrangères à la flore suisse (France méridionale). La chenille vivra sans doute chez nous sur d'autres espèces voisines. *Carlina*, *Serratula*, *Crupina*.



Ch. en avril, puis en juin et juillet sur *Calamintha Nepeta Cataria* et *Origanum*. Pap. en avril et mai, puis en août et septembre. Rare. Haut-Valais (And.); environs de La Croix.

**Genr. Pselnophorus Wallgr. 1881.**

**Brachydactylus** Tr. IX, 2, 238. *Ætodactylus* Dup.

Ch. en mai et juin sur *Prenanthes purpurea*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région forestière, dans les endroits frais. Près de Grimentz (de R.).

**Gen. Marasmarcha Meyr. 1886.**

**Phæodactyla** Hb. 14. *Lunædactylus* Hw.

Ch. en mai et juin sur les fleurs, les feuilles et les tiges d'*Ononis spinosa* et *repens*. Pap. en juillet et août. Très rare. Région chaude. Haut-Valais (And.); Martigny, Fully, Salquenen.

**Gen. Pterophorus Geof. 1762 (Alucita Meyr.).**

**Lithodaactylus** Tr. IX, 2, 245. *Lithoxylodactylus* Dup.

Ch. en juin sur *Inula salicina* et *dysenterica*, sur les jeunes fleurs et ensuite sur les feuilles. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (And.); près de Tourtemagne (F.).

**Rogenhoferi** Mn. z. b. V. 1871, p. 79.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région alpine jusqu'à 2000 m. et plus. Au-dessus de Zermatt (Frey).

**Monodactylus** L. S. N. X, 542. *Pterodactyla* Hb.

Ch. en mai et juin, puis en juillet et août sur *Convolvulus arvensis* et *sepium*, *Matricaria*, *Chenopodium*,

*Atriplex*. Pap. en avril et mai, puis en août et septembre. Rare. Haut-Valais (And.); Martigny, Fully.

? *Osteodactylus* Z. Is. 1841, 851, t. 4. f. 8, 9. *Cinerariæ* Mill.

Ch. sur *Solidago Virgaurea*. Pap. en juillet. M. de Rougemont nous dit avoir pris en grand nombre dans la région chaude du Valais un *Pterophorus* que J. Müller lui a déterminé comme *Tetradactylus* L., mais qui s'en distingue essentiellement : 1<sup>o</sup> par la teinte jaune-soufre de l'abdomen, tandis qu'elle est blanchâtre chez *Tetradactylus*; 2<sup>o</sup> par sa taille toujours plus petite; 3<sup>o</sup> par son habitat moins élevé. Il correspond fort bien à la figure que Millière donne du *Cinerariæ* Icon. III, pl. 152. Or Rebel, dans le Cat. Staud., dit que cette figure se rapporte à l'*Osteodactylus* Z.

**Microdactylus** Hb. 26-27.

Ch. de septembre en avril suivant sur *Eupatorium cannabinum*, sur les pousses, les fleurs et les tiges. Pap. en mai et juin. Pas commun. Région inférieure. Martigny, pied du Mt d'Autan, Fully.

### **Gen. Stenoptilia Hb. 1818.**

**Pelidnodactyla** Stein Is. 1837, p. 105. *Mictodactylus* var. a) Z.

Ch. en mai sur *Globularia alpina* et *Saxifraga granulata* (2-3 sur chaque plante). Pap. de mai en août. Rare. Dans la région chaude. Haut-Valais (And.); coteau de Ravoire, Branson.

**Coproductyla** Z. L. E. VI, 366.

Ch. en mai et juin sur les fleurs de *Gentiana verna*. Pap. en juillet et août. Assez commun, surtout dans les pâturages alpestres jusqu'à 2000 m. Mt Rose (Frey); vallées d'Anniviers et de Tourtemagne, etc. (de R).

**Zophodactyla** Dup. XI, 314, 4. Loewii Z. Hodgkinsonii Gr.

Ch. en juin et juillet, puis en août et septembre sur *Erythræa Centaurium*, dans les capsules fraîches. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare et localisé. Plaine et coteaux de la région inférieure. Coteau de Ravoire.

**Bipunctidactyla** Hw. Lep. Br. 476. Serotinus Z.

Ch. en avril et mai, puis en juillet sur *Scabiosa*, *Scutellaria*, *Galium verum* et *Mollugo*, dans les pousses et dans les tiges. Pap. pendant toute la belle saison. Pas rare. Dans la région inférieure. Bouveret, au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

*a* **var. Plagiodactyla** Stt. Cat. Suppl. 28. Ailes antérieures plus foncées, mêlées d'écailles blanches, le sillon foncé du premier doigt plus allongé et plus fort.

Ch. en mai et juin sur *Gentiana asclepiadea*. Pap. en juin et juillet. Rare. Prairies et pâturages. Val d'Illicz, au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

**Pterodactyla** L. F. S. N<sup>ro</sup> 1456. Ptilodactyla Hb. Fuscodactylus Hw.

Ch. en mai, puis en juin et juillet sur *Veronica Chamædrys* et *arvensis*. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Rare. Cultures et coteaux boisés. M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Paludicola** Wallgr. Fjäderm. 18. Fuscus var. c. et d. Z.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Endroits humides. Martigny, Sion, Sierre.

### **Gen. Agdistis Hb. 1818.**

**Tamaricis** Z. Is. 1847, 899. (Paralia.)

Ch. en juin, puis en septembre et octobre sur *Tamarix germanica*. Curieuse, très bien décrite et figurée par Millière; Pap pendant toute la belle saison;

au repos, il tient les ailes droit en avant, ce qui lui donne l'air le plus étrange possible. Rare. Région chaude et bords des torrents jusqu'à 1500 m. Baltschieder (Jäg.); Salquenen (de R.), Täsch.

### III. ORNEODIDÆ.

**Gen. Orneodes Latr. 1796 (Alucita Z.).**

**Dodecadactyla** Hb. 29.

Ch. sur les jeunes pousses de *Lonicera Xylosteum*. Pap. en juin. Très rare. Plutôt dans la région chaude. Salquenen (de R.).

**Hexadactyla** L. S. N. X, 542. Polydactyla Hb.

Ch. en juin et juillet dans les fleurs fermées des divers *Lonicera*. Pap. de juillet en septembre et hivernant jusqu'en mai. Pas rare, surtout dans les maisons, contre les murs. Martigny-Ville, Sion, Sierre, Salquenen.

**Hübneri** Wallgr. Fjäderm. p. 24. Hexadactyla Hb.

Ch. en mai et juin sur *Scabiosa* dans des renflements sur les tiges florales. Pap. comme le précédent. Rare. Haut-Valais (And.); Martigny, Fully, Sion, Sierre, Salquenen.

### IV. TORTRICIDÆ.

A. Tortricinæ.

**Gen. Acalla (Hb. 1818) Meyr. (Teras Tr. 1829.)**

**Emargana** F. S. E. 651, N<sup>ro</sup> 37. Excavana Hw. Ailes antérieures jaunes avec des dessins foncés.

Ch. de mai en juillet sur les chatons et sur les feuilles de saules, bouleaux, peupliers, etc. Pap. d'août en septembre. Pas commun. En Valais (Paul).

*a* **var. Caudana** F. S. E. 651 N<sup>ro</sup> 38. Effractana Hb. Ailes antérieures d'un gris violacé, presque unicolores.

*b*) **var. Effractana** Fröl. En. Tort. p. 27. Caudana Hb. Plus foncé, ailes antérieures brunes, côte moins creusée.

L'une et l'autre forme se trouvent çà et là avec le type. En Valais (Paul).

**Cristana** F. Mant. 233. Rossiana F. Lefeburiana Dup. Ailes antérieures foncées, tête et thorax blancs.

Ch. en juin et juillet sur bouleau, orme, prunellier, saule, etc., dans les jeunes pousses.

Pap. de juillet en septembre. Assez rare. En Valais (Paul); Salquenén (de R.).

*a*) **ab. Albipunctana** Steph. 152. Ailes antérieures foncées, avec un point médian blanc ;

*b*) **ab. Striana** Hw. p. 413. Combustana Dup. Ailes antérieures d'un roux cannelle, tête et thorax étroitement blancs ou cendrés ;

*c*) **ab. Desfontainana** F. E. S. 268. Ailes antérieures de couleur cannelle, extérieurement grises, partie médiane rousse dès la base ;

*d*) **ab. Spadiceana** Hw. p. 412. Ailes antérieures de couleur ocre et cannelle à l'extérieur, tête et thorax d'un roux ocracé ;

*e*) **ab. Albicostana** Sand. Cat. Lep. Ber. p. 133. Ailes antérieures avec la côte blanche ;

*f*) **ab. Cristalana** Don. Nat. Hist. III, t. 77. Ailes antérieures d'un brun cannelle, avec une grande tache costale blanchâtre ;

*g*) **ab. Ruficostana** Curt. B. E. I. t. 16. Ailes antérieures cendrées, avec une large plaque rouge dès la base, tête et thorax étroitement blancs ;

- h) **ab. Profanana** F. E. S. 268. Ailes antérieures concolores, cendrées ou ocracées, ou brun rouge, tête et thorax parfois beaucoup plus clairs.

Toutes ces formes se rencontrent avec le type, surtout si l'on fait un élevage.

**Umbrana** Hb. 59. **Radiana** Dup.

Ch. sur saule et sorbier. Pap. au printemps. Très rare. Un seul ex. du Valais, peut-être de Salquenen (de R.).

**Hastiana** L. S. N. X. p. 222 N<sup>ro</sup> 532. **Scabrana** Hb. Ailes antérieures brunâtres ou grisâtres, avec les dessins bruns obsolètes.

Ch. en mai et juin sur les saules et les peupliers. Pap. en printemps, puis de fin juillet en septembre. Pas rare. Région inférieure. Martigny, Branson, Follatères, Salquenen.

- a) **ab. Coronana** Thb. Diss. Ent. I, p. 18. **Buringerana** Hb. 216. **Leprosana** Fröl., **Abietana**, Dup. **Scabrana** HS. Ailes antérieures avec une bande blanche avant le milieu. Branson, La Croix ;

- b) **ab. Byringerana** Hb. Vög. 97. Ailes antérieures brunâtres, mêlées de roux, avec des bandes jaunâtres ;

- c) **ab. Psorana** Fröl. l. c. p. 20. Ailes antérieures cendrées (brunâtres), avec une strie noire dès la base. La Croix, Branson ;

- d) **ab. Aquilana** Hb. 235. Ailes antérieures d'un cannelle foncé, avec le thorax jaune ;

- e) **ab. Autumnana** Steph. 155. Ailes antérieures jaunâtres, avec des écailles brunes relevées ;

- f) **ab. Radiana** Hb. 177. Ailes antérieures jaunes (roussâtres), avec des stries noires de la base à la marge externe. Valais (Paul).

- g) **ab. Combustana** Hb. 234, Ailes antérieures de couleur cannelle, avec une large bandelette dorsale jaunâtre, bande et plaque apicale plus claires, indistinctes. Valais (Paul).
- h) **ab. Costimaculana** Wck. Bresl. c. Z. 1874 p. 16. Ailes antérieures d'un gris blanchâtre, avec une tache costale carrée, obscurément brune ;
- i) **ab. Divisana** Hb. 198. Ailes antérieures avec la partie dorsale brunâtre et la partie costale blanchâtre, divisées par une ligne noire de la base à l'apex. Branson, La Croix ;
- k) **ab. Mayrana** Hb. 335. Ailes antérieures noirâtres, avec la partie médiane de la base à l'apex blanche ou jaune ;
- l) **ab. Albistriana** Hw. p. 412. Ailes antérieures noirâtres ou foncées, avec une plaque dorsale blanchâtre.

Toutes ces formes se trouvent avec le type, plus ou moins rares.

**Maccana** Tr. X, 3, 33. Marmorana West. Balsaticola Staud.

Ch. en juillet et août sur *Sedum palustre*, *Vaccinium Myrtillus* et *uliginosum*. Pap. en août, passant l'hiver pour reparaitre au printemps. Rare. Dans la région forestière et les sous-alpes. M<sup>t</sup> Chemin.

**Logiana ab. Germarana** Fröl. N<sup>ro</sup> 22. Boscana Steph. Erutana HS.

Ch. en juin et juillet sur *Viburnum Lantana* et *Opulus*. Pap. en août et septembre, puis au printemps. Pas commun. Région inférieure. Haut-Valais (And.) ; environs de Sierre.

**Hippophaëana** Heyd. Stt. e. Z. 1865 p. 377, Ragatzana Heyd. l. c.

Ch. en juillet et août dans les feuilles des jeunes pousses liées ensemble de l'*Hippophae rhamnoides*.

Pap. en septembre et octobre, puis au printemps suivant. Rare. Région chaude. Haut-Valais (And.) ; Martigny, Branson.

**Variegana** Schiff. S. V. 130. Abildgaardana Fröl. Cristana Hb.

Ch. de mai en juillet sur divers arbustes ; *Carpinus*, *Betula*, *Cotoneaster*, *Prunus*, *Crataegus*, *Pyrus*, *Ulmus*, etc. Pap. d'août et septembre jusqu'au printemps. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 2000 m. près Martigny, La Croix, La Forclaz, M<sup>t</sup> Chemin, Sion, Sierre, Salquenen, Zermatt.

a) **ab. Asperana** F. Gn. 292. Nyctemerana Hb. Ailes antérieures avec la partie basale blanche et l'apicale d'un noir de plomb.

Avec le type, mais plus rare. Martigny (F.) ; Salquenen (de R.). *Obs.* M. de Rougemont se demande si ce n'est pas une espèce propre.

**Boscana** F. E. S. 269. Cerusana Hb. Forme blanche, avec la tache tripartite costale foncée.

Ch. en juin sur l'orme. Pap. de juillet en avril suivant. Rare. Dans la région inférieure. Martigny, Fully.

a) **var. Parisiana** Gn. Ind. p. 8 (gen. æst.) Forme cendrée, avec la tache costale moins distincte.

Assez rare. Région inférieure. Haut-Valais (And.) ; Martigny.

**Literana** L. var. Squamana F. S. E. 651. Squamulara et Irrorana Hb.

Ch. de mai en juillet sur le chêne. Pap. de juillet au printemps suivant. Assez rare. Région chaude des arbres à feuilles. Haut-Valais (And.) ; Branson.

**Niveana** F. Mant. II, p. 233. Treueriana Hb. Cerusana Dup.

Ch. en juin et juillet sur *Betula alba*. Pap. d'août au printemps suivant. Assez rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (And.) ; mayens de Sion.

**Roscidana** Hb. 103. Nebulana Hb. 104.



Ch. en juin et juillet sur *Populus tremula*. Pap. comme le précédent. Rarissime. Région chaude des arbres à feuilles. Au-dessus de Plan-Cerisier.

**Lipsiana** Schiff. S. V. 129. Sudoriana Hb.

Ch. en juin et juillet sur *Betula alba* et *Pyrus communis*. Pap. en août et septembre. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (And.).

**Sponsana** F. Mant. 255. Favillaceana Hb. Reticulana Wd.

Ch. en juin et juillet sur *Acer pseudoplatanus*, *Fagus*, *Quercus*, *Sorbus Aucuparia*, etc. Pap. d'août au printemps suivant. Rare. Région des arbres à feuilles. Haut-Valais (And.); environs de Martigny, Salquenen.

**Rufana** Schiff. S. V. 129. Autumnana Hb. Bistriana Wd.

Ch. en juin sur divers saules. Pap. comme le précédent. Assez rare. Région des arbres à feuilles. La Croix (W.); Salquenen (de R.).

**Schalleriana** L. F. S. N<sup>ro</sup> 1139. Latifasciana Hw.

Ch. en mai et juin sur *Symphytum officinale*. Pap. en août et septembre. Rare. Région chaude. En Valais (Paul).

a) **var. Comparana** Hb. 288. Forme ocracée, avec la tache costale foncée.

Rare. Région chaude. Salquenen (de R.).

**Aspersana** Hb. 259. Subtripunctana Steph.

Ch. en juin et juillet sur *Spiræa Ulmaria*, *Alchemilla*, *Fragaria*, *Potentilla*, *Vicia*, etc. Pap. de juillet au printemps. Rare. Plaine et sous-alpes. Sur le Simplon (Bent.); Salquenen (de R.).

**Ferrugana** Tr. VIII, 263. Gnomana et Bifidana Wd.

Ch. en mai et juin sur *Betula*, *Alnus*, *Fagus*, *Populus tremula*, *Quercus*, etc. Pap. de juillet au prin-

temps. Pas rare. Région des arbres à feuilles. Martigny, La Croix. Branson, Follatères (W. et F.) ; Salquenen en mars 1905 (de R.).

**Lithargyrana** HS. 23, IV p. 147. Rufana Hb.

Ch. de juillet en septembre sur *Betula*, *Fagus*, *Populus*, *Quercus*, etc. Pap. de septembre en avril suivant. Rare. En Valais (Paul) ; M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin.

**Quercinana** Z. Stt. e. Z. 1849 p. 283.

Ch. en mai et juin sur *Quercus*. Pap. en juillet et août. Très commun. Région chaude inférieure. Branson, Follatères, Plan-Cerisier, M<sup>t</sup> Ravoire, Sion, Sierre.

**Holmiana** L. S. N. X, 532.

Ch. en mai et juin sur *Crataegus*, *Prunus*, *Rosa*, *Pyrus*, etc. Pap. de juin en août. Commun là où il vole, mais pas très répandu et seulement dans la région inférieure ; il varie beaucoup. Haut-Valais. (And.) ; environs de la Croix (W.) ; Salquenen à la fin de l'été où il vole autour des buissons d'épine (de R.).

**Contaminana** Hb. 142.

Ch. en mai et juin sur *Crataegus*, *Prunus*, *Rosa*, *Quercus*, etc. Pap. en août et septembre. Assez rare. Région des arbres à feuilles. Martigny, Fully.

- a) **ab. Ciliana** Hb. 171. Obscurana Don. Ailes antérieures ocracées, moins dessinées, avec la bande médiane diminuée ;
- b) **ab. Dimidiana** Fröl. N<sup>ro</sup> 27. Rhombana Steph. ailes antérieures presque unicolores, d'un brun violacé.

L'une et l'autre en Valais (Paul).

**Lorquiniana** Dup. IX, 244. 7 p. 165. Atrosignana Hb. Uliginosana Wst.

Ch. en mai, puis en juillet et août au bout des feuilles de *Lythrum Salicaria*. Pap. en juin, puis d'août en octobre. Rare. Région inférieure. Martigny, Fully.

**Gen. Amphisa Curt. 1828 (Philedone (Hb.) Meyr).**

**Gerningana** Schiff. S. V. 318. Pectinana Hb.

Ch. polyphage sur les plantes basses : *Scabiosa*, *Lotus*, *Plantago*, etc. Pap. de juillet en août. Rare. Plaine et sous-alpes. Environs de Sion et de Sierre. *Obs.* Paul signale aussi en Valais A. *Prodromana* Hb.

**Grotiana** F. Mant. 235. Flavana Hb.

Ch. en avril et mai sur *Cratægus* et *Quercus*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Branson.

**Gnomana** Cl. Ic. 4, 13. Livoniana Sod.

Ch. polyphage sur les arbres forestiers et sur *Vaccinium Myrtillus*. Pap. en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. St-Nicolas, près Zermatt (Lah.); Viège, Mœrell (Bent.); M<sup>t</sup> Chemin (F.); Salquenen (de R.).

**Gen. Capua Steph. 1834.**

**Angustiorana** Hw. Lep. Br. p. 429. Dumeriliana Dup.

Ch. en avril et mai sur *Laurus*, etc. Pap. en mai et juin. Très rare. Haut-Valais (And.).

**Reticulana** Hb. 271. Orana F. R.

Ch. en mai sur *Rosa*, *Lonicera*, *Salix*, *Populus*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (And.); environs de Martigny, Sion.

**Favillaceana** Hb. 255. Terreana Tr. Ochraceana Steph.

Ch. en automne sur *Sorbus Aucuparia*, *Rubus idæus*, *Salix*, *Alnus*, etc. Pap. en mai et juin. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m., dans les forêts de chênes et de hêtres. Plan-Cerisier, Branson.

**Gen. *Ænophthira* Dup. 1844. (*Ænetra* Gn.,  
*Sparganothis* (Hb.) Meyr).**

**Filleriana** Schiff. S. V. 126. Luteolena Hb.

Ch. en automne et printemps sur *Vitis*, *Lupulus*, *Clematis*, *Salvia*, *Stachys*, etc. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région inférieure. Martigny, Branson, Sion, Sierre, Viège, Salquenen.

*Obs.* C'est le ver de la vigne, mais trop rare ces dernières années pour causer un réel dommage.

**Gen. *Cacœcia* Hb. 1818.**

**Piceana** L. S. N. X. 531 ♂. Oporana Hb. 112 ♀.

Ch. d'avril en juin sur les conifères et le genévrier. Pap. de juin en août. Rare. Dans les bois de conifères. M<sup>t</sup> Chemin, val de Tourtemagne.

**Podana** Sc. Ent. Carn. p. 232. Pyrastrana Hb. 124 ♂  
Congenerana Hb. 295 ♀.

Ch. en avril et mai sur *Acer campestre* et *platanoides*, *Berberis*, *Lonicera*, *Salix* et autres arbustes. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (And.) ; Martigny, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

*Obs.* La grande différence entre les deux sexes les a fait prendre pour des espèces différentes.

**Decretana** Tr. X, 3. 56.

Ch. en juin sur *Betula* et *Corylus*. Pap. en juillet et août. Rare. En Valais (Paul) ; Sierre.

**Cratægana** Hb. 107 ♀. Roborana Hb. 126 ♂.

Ch. sur *Cotoneaster*, *Populus tremula*, *Pyrus Malus*, *Quercus*, *Betula*, *Mespilus*, etc. Pap. de juin en août. Commun partout dans les forêts. Martigny, Fully, co-teau de Ravoire, La Croix, Salquenen.

**Xylostæana** L. S. N. X. 531. Characterana Hb.

Ch. en avril et mai sur *Quercus*, *Populus*, *Pyrus*, *Sorbus Aucuparia*, *Hypericum* et *Rubus*. Pap. de juin en août. Assez commun. Naters, Plan-Cerisier, Mt Ravoire, Branson, Salquenen.

**Rosana** L. S. N. X, 530. *Laevigana* Schiff. *Oxyacanthana* Hb.

Ch. polyphage sur les plantes basses et sur beaucoup d'arbustes forestiers. Pap. en juin et juillet. Assez commun. Dans la région des arbres à feuilles. Martigny, Plan-Cerisier, Fully, Branson.

**Sorbiana** Hb. 113. *Avellana* Hw.

Ch. en avril et mai sur *Quercus*, *Sorbus*, *Prunus*, *Cerasus*, *Pyrus* *Malus*, etc. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans les taillis de la région inférieure. Martigny, Fully, Branson, Plan-Cerisier (W. et F.); Salquenen (de R.).

**Lafauryana** var. **Nigricana**. Rag. Bull. S. Fr. 1876 p. 403.

Ch. sur *Myrica Gale*; nous n'avons pas cette espèce, elle vit donc aussi sur d'autres plantes. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région inférieure. Dans les environs de Martigny, Salquenen.

**Costana** F. Mant, 227. *Gnomana* Hb. *Latorana* Stt.

Ch. en mai et juin sur *Iris Pseudacorus* et *Scirpus palustris*. Pap. en juin et juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. Près de Zermatt (Frey).

**Histrionana** Fröl. p. 57 N<sup>ro</sup> 125.

Ch. d'avril en juin sur *Pinus Abies* et *Picea*. Pap. de mai en août. Rare. Dans la région des conifères. Mt Chemin.

**Musculana** Hb. 98. *Trifasciana* Hw.

Ch. d'août au printemps suivant sur plantes basses et arbres forestiers. Pap. d'avril en juin. Rare. Dans la région des arbres forestiers et jusqu'à 2000 m. et plus. Haut-Valais (And.); Salquenen (de R.).

**Eriferana** HS. 202, IV p. 223.

Ch. en mai et juin sous les écorces d'*Acer platanoides* et sur le mélèze. Pap. en juin et juillet. Rare. En Valais (Paul); Martigny (F.); Stalden (de R.).

**Strigana** Hb. 141. Rhombicana HS. 46 ♀.

Ch. en mai et juin sur les plantes basses : *Artemisia*, *Gnaphalium*, etc. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les sous-alpes. Ollon (Lah.); Salquenen.

a) **var. Stramineana** HS. 39-40, IV p. 163. Ailes antérieures unicolores, d'un jaune paille.

Dans le Haut-Valais (And.).

**Lecheana** L. S. N. X, 531. Obsoletana Steph.

Ch. en avril et mai sur *Quercus*, *Populus*, *Fagus*, *Salix*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Près de Viège (Bent.).

### **Gen. Pandemis Hb. 1818.**

**Corylana** F. E. S. 260. Textana Hb. 115.

Ch. en mai sur *Corylus*, *Fagus*, *Prunus Padus*, *Quercus* et autres arbustes. Pap. de juin en août. Très répandu dans la région forestière inférieure. Martigny, Fully, Salquenen.

**Ribeana** Hb. 114. Grossulariana Steph.

Ch. en avril et mai sur *Betula*, *Populus*, *Prunus*, *Pyrus*, *Quercus*, *Sorbus*, *Tilia*, etc. Pap. de mai en août. Assez commun. Plaine et région montagneuse. La Croix, Martigny, Branson, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

a) **var. Cerasana** Hb. 119. Ailes antérieures avec des bandes foncées et enfumées sur la marge dorsale.

Pas commun. En Valais (Paul); Salquenen.

**Cinnamomeana** Tr. VIII. 61, X, 3, 60.

Ch. sur *Vaccinium Myrtillus*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. De la plaine aux sous-alpes. Salquenen, etc. Cette espèce s'élève assez haut; M. de Rougemont a

obtenu un papillon d'une chenille prise sur le bouleau au-dessus de Saas-Grund. Le ♂ se distingue par son front blanc de neige.

**Heparana** Schiff. S. V. 128. Carpiniana Hb. Rubrana Sod.

Ch. d'avril en juin sur *Acer campestre*, *Berberis*, *Betula*, *Corylus*, etc. Pap. de juin en août. Assez commun. Plaine et région sous-alpine. Simplon, Martigny, Branson, Salquenen.

a/ **ab. Vulpisana** HS. 34, IV p. 166. Beaucoup plus foncé, ailes antérieures unicolores foncées.

Avec le type, mais plus rare. Branson, Plan-Cerisier, coteau de Ravoire.

### **Gen. Eulia Hb. 1818. (Lophoderus Steph. 1829).**

**Ochreana** Hb. 134. Ferrugana Hb.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur *Anemone Pulsatilla* et autres plantes basses. Pap. pendant toute la belle saison. Pas rare. Dans la région chaude inférieure. Viège, Branson, M<sup>t</sup> Ravoire, Plan-Cerisier, Salquenen.

**Politana** Hw. Lep. Br. 229. Sylvana Tr. Lepidana HS.

Ch. en juillet, puis en septembre et octobre sur *Centaurea Jacea*, *Erica vulgaris*, *Ranunculus acris*, *Senecio Jacobea*, *Vaccinium Myrtillus* et *uliginosum*, etc. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Assez rare. En Valais (Paul); M<sup>t</sup> Chemin.

**Cinctana** Schiff. S. V. 129. Albidana Hb.

Ch. en mai et juin sur *Artemisia campestris* et *Anthyllis Vulneraria*. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (And.); environs de Martigny.

**Rigana** Sodof. Bull. M. 1829 p. 144, t. 3, f. 3. Horridana Hb. Modestana Tr.

Ch. en mai et juin sur *Anemone Pulsatilla*, *Clematis*, etc. Pap. en juillet et août. Pas rare sur les pâturages rocheux des hautes alpes et elle est toujours très abondante là où elle se trouve. Alpes d'Anniviers et de Tourtemagne, etc. (de R.).

Obs. M. de Rougemont dit que cette espèce doit hurler de l'entourage qu'on lui donne, car elle n'a rien à faire avec les *Tortrix* !

a/ **var. Monticolana** Frey Lep. 288. Plus petit et plus gris.

Lac-Noir au-dessus de Zermatt (Frey) ; très commun un peu au-dessus de l'hôtel Riffelberg (de R.).

**Oxyacanthana** HS. 161, IV p. 168.

Ch. en mai et juin sur *Crataegus oxyacantha*. Pap. en juin et juillet. Rare. Coteaux de la région inférieure. La Croix, Branson.

**Ministrana** L. S. N. X, 531. Ferrugana Hb. 56.

Ch. en automne et printemps, polyphage sur les arbres forestiers. Pap. en mai et juin. Pas commun et seulement dans la région chaude. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1000 m. Mt Chemin, Mt Ravoire, Follatères près Branson, Salquenen.

### **Gen. Tortrix (L.) Meyr. (Heterognomon Ld.).**

**Forskaleana** L. S. N. X, 531. Forskoleana Hb. 143.

Ch. en mai et juin sur *Acer pseudoplatanus* et *Ulmus campestris*. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. En Valais (Paul).

**Bergmanniana** L. S. N. X, 531. Rosana Hb. 137.

Ch. en avril et mai sur *Rosa*, *Prunus*, *Corylus*, *Evonymus*, etc. Pap. en juin et juillet. Pas commun, mais un peu partout et ne s'élevant pas très haut. Plaine et région montagneuse jusqu'à 1600 m. Martigny, Fully, Salquenen.



**Conwayana** F. S. E. 653. Hofmannseggana Hb.

Ch. en automne dans les baies de *Ligustrum vulgare*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Environs de Sion et de Sierre (Paul).

**Bifasciana** Hb. Btr. 1, 2, 3. M. Ardouinana Dup.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare et peu répandu, plutôt dans la région chaude. Plusieurs ex. de Salquenen (de R.).

**Löfflingiana** L. S. N. X, 531. Plumbana Hb. 54.

Ch. en avril et mai sur le chêne. Pap. de juin en août. Pas rare ; il vole en quantité sur les buissons de chênes de la région chaude inférieure et varie à l'infini. Viège, Salquenen, Branson, coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier.

a/ **ab. Ectypana** Hb. 190. Ailes antérieures presque unicolores, avec les bandes presque nulles.

Avec le type, mais rare. Branson, Salquenen, Viège.

**Viridana** L. S. N. X, 530.

Ch. en avril et mai sur le chêne. Pap. en juin et juillet. Très commun partout dans la région chaude et jusqu'à plus de 1000 m. Mt Ravoire, Branson, Follatères, au-dessus de Plan-Cerisier, Sion, Sierre, Salquenen, etc.

a/ **ab. Suttneriana** Schiff. S. V. 127. Ailes antérieures d'un jaune soufre.

Avec le type, mais plus rare. Branson, Follatères.

**Pronubana** Hb. 121 ♂. Ambustana 332 ♀.

Ch. de l'automne en juin suivant sur *Daphne*, *Calamintha* et *Nepeta Cataria*, *Asphodelus*, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Pas commun. Haut-Valais (And.).

**Forsterana** F. Sp. 279. Adjunctana Tr. Sineana Frr.

Ch. en mai sur *Vaccin*, *Myrtillus*, *Vitis-Idæa* et *uliginosum*, *Lonicera* et *Ribes*. Pap. en juin et juillet.

Rare. Plaine et alpes jusqu'à 2500 m. Coteau de Ravoire, Mt Chemin, La Forclaz ; un ex. au milieu d'un sauvage pierrier au pied du roc d'Orzival à 2500 m. au moins (de R.).

**Viburniana** F. Mant. II, 229. Unitana et Rhombana Hb.

Ch. en mai et juin sur les feuilles radicales des *Ombellifères*, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Assez commun dans les environs de Sion et de Sierre (Paul).

a/ **ab. Galiana** Curt. XVI, t. 762. *Scrophulariana* HS. Ailes antérieures d'un brun rouge.

Avec le type.

**Paleana** Hb. Vög. 30. Flavana Hb. 157. Palleana Tr.

Ch. en juin sur *Cirsium lanceolatum* et *oleraceum*, *Scabiosa*, *Vaccinium Myrtillus*, etc. Pap. en juillet et août. Rare ; il vole dans la région sous-alpine. Un ex. de Gruben dans la vallée de Tourtemagne, en juillet 1904 (de R.).

a/ **var. Intermediana** HS. 420-21, VI p. 157. Ailes antérieures d'un ocre pâle, les postérieures blanchâtres.

Comme le type, mais rare. La Vare au-dessus de Bex (Lah.).

b/ **var. Ieterana** Fröl. N<sup>ro</sup> 154. Flavana Hb. 258.

Forme plus foncée, ailes antérieures entièrement de couleur soufre ou citron, les postérieures foncées.

Avec le type, mais très rare.

**Steineriana** Hb. 170. Chrysitana Hb. 317.

Ch. en mai et juin sur *Veratrum album*, *Anemone Hepatica*, *Dentaria*, *Luzula albida*, *Sanicula*, *Vaccinium uliginosum* et *Myrtillus*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région alpine jusqu'à 2000 m. Ormont-dessus (Lah.).

**Rogana** Gn. Ind. 6. Lusana HS. Steineriana HS.

Ch. en mai et juin sur *Anemone Hepatica*, *Veratrum album* et autres plantes basses. Pap. en juillet et août. Rare. Région sous-alpine. Val d'Illiez (Lah.); La Forclaz, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

a/ **var. Dohrniana** HS. VI, p. 156. Plus grand et plus pâle.

Avec le type. Haut-Valais (And.); val d'Illiez (Lah.); M<sup>t</sup> Chemin (F.); Gruben (de R.).

Obs. M. de Rougemont trouve que ses ex. de Gruben s'en distinguent : 1<sup>o</sup> par une taille plus grande; 2<sup>o</sup> par les ailes plus amples à proportion du corps; 3<sup>o</sup> par plusieurs bandes transversales d'écailles plombées, mais qui ne sont distinctement visibles que lorsqu'on regarde le papillon à un certain jour (de biais).

**Rusticana** Tr. VIII. 95. Helvolana et Senecionana Hb.

Ch. en août et septembre sur *Gentiana Amarella*, <sup>1)</sup> *Lotus*, *Vaccinium Myrtillus*, etc. Pap. d'avril en juin. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (And.); M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Diversana** Hb. 251. Transistana Gn.

Ch. en mai et juin, polyphage sur les arbres forestiers. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. Environs de Sion et de Sierre (Paul); Salquenen (de R.).

## **Gen. Cnephasia Curt. 1826. (Sciaphila Tr. 1830).**

**Osscana** Sc. Ent. Carn. p. 128. Pratana Hb. Stelviana Mill.

Ch. sous les pierres, ainsi que la Chrysalide, polyphage sur les plantes basses. Pap. en juillet et août. Répandu

---

<sup>1)</sup> Cette espèce ne se trouvant pas en Suisse, il s'agit sans doute des *G. germanica* et *campestris*. Note de l'Edit.

un peu partout, sans être commun nulle part, dans les pâturages des Alpes. M<sup>t</sup> Ravoire, Bovine, Arpille, Pierre à Voir, Zermât, Simplon, etc.

**Argentana** Cl. Ic. 11, 14. Gouana L. Magnana Hb.

Ch. dans les ombelles des *Laserpitium* et autres grandes Ombellifères. Pap. en juillet et août; il vient au réflecteur Partout jusqu'à 1800 m., même très commun par places, dans la région alpine. La Forclaz, Bovine, Arpilles (F.); il volait par essaims au pied des rochers au S.-O. de Zinal (de R.).

**Penziana** Thbg. Diss. III p. 56. Diurneana Gn.

Ch. en mai et juin sur *Hippocrepis comosa*, *Sedum*, *Sempervivum*. Pap. en juin et juillet. Assez rare et toujours isolé, ne dépassant guère la région des forêts. Zermatt (Frey); M<sup>t</sup> Chemin, La Forclaz, Trient (F.); vallées d'Anniviers et de Tourtemagne, etc. (de R.).

**Chrysanthæana** Dup. Suppl. IV, 83, 5 p. 410. Chrysanthemana HS.

Ch. en mai et juin sur *Chrysanthemum*, *Anthemis*, etc. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Dans la région sous-alpine et jusqu'à 2000 m. M<sup>t</sup> Chemin, M<sup>t</sup> Ravoire, La Forclaz.

**Wahlbomiana** L. S. N. X, 532. Communana HS.

Ch. en avril, mai et juin, polyphage sur beaucoup de plantes basses, arbres forestiers et arbustes. Pap. de juin en août. Assez commun et ne montant pas très haut. Plaine et région montagneuse. Martigny, Branson, M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Sierre, Salquenen, sur le Simplon, etc.

a) **var. Alticolana** HS. 112, IV, p. 200. Ailes antér. cendrées, avec les bandes plus obscures. M<sup>t</sup> Chemin, M<sup>t</sup> Ravoire, Salquenen, Zermatt, Gamsen.

b) **var. Virgaureana** Tr. X, 3, 89. Plus petit, avec les ailes antér. plus unicolores, grises. Branson, Ravoire, La Forclaz, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen. Obs. M. de Rougemont se demande si ce n'est pas une espèce propre.

c) **var. Derivana** Lah Tort. N<sup>ro</sup> 115. Paraliana Z.  
Ailes antér. d'un cendré blanchâtre, avec la  
bande médiane teintée de jaunâtre après la  
cellule.

Prés Aigle (Lah.).

**Incertana** Tr. X, 3 p. 91. Subjectana Gn. Forme  
plus blanche, avec les ailes antér. plus distinctement  
dessinées.

Ch. d'avril en juin sur plantes basses, arbustes et  
arbres forestiers. Pap. de juin en août. Rare. Environs  
de Sion et de Sierre (Paul) ; M<sup>t</sup> Chemin, La Forclaz.

a) **var. Minorana** HS. 104-6, IV p. 201. Minuscu-  
lana Z. Plus foncé et plus unicolore. Ravoire,  
La Forclaz, Gamsen, Simplon.

**Abrasana** Dup. Suppl. IV, 83, 2 p. 407.

Ch. en avril et mai sur *Achillea millefolium*. Pap.  
en juin et juillet. Rare. Sion en mai (Lah.).

**Nubilana** Hb. 111. Hybridana Dup.

Ch. d'août au printemps sur *Betula*, *Crataegus*,  
*Prunus spinosa*, *Pyrus*, etc. Pap. de mai en juillet.  
Assez rare. Région des arbres à feuilles. Plan-Cerisier,  
Salquenen.

### **Gen. Sphaleroptera Gn. 1845.**

**Alpicolana** Hb. 328-329 ♂, HS. 395 ♀.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Très répandu  
en Valais, surtout dans les plus hauts pâturages des  
Alpes, de 2400 à 2600 m. Zermatt, Riffel, Gornergrat,  
Simplon, col d'Orzival, Lac de Lona, Meidenalp, etc.  
*Obs.* Les ailes de la ♀ sont à demi atrophiées ; on ne  
la trouverait pas si sa présence n'était signalée par  
l'essaim des ♂ qui tourbillonnent à l'entour.

**Gen. Doloploca Hb. 1818.**

**Punctulana** Schiff. S. V. 130. Schlemmerella Hb.  
Punctulella Tr.

Ch. en août et septembre sur *Lonicera*, *Berberis*, *Ligustrum*, etc. Pap. en mai. Assez rare. Dans la région chaude. Haut-Valais (And.) ; au-dessus de Plan-Cerisier.

**Gen. Cheimatophila Steph. 1829.**

**Tortricella** Hb. Tin. 11. Alternella et Hyemella  
Tr. Hyemana Hb.

Ch. en mai et juin sur le chêne, de préférence sur les buissons ; elle a les mêmes couleurs que celle de la *Dicycla* Oo. Pap. de la fin de l'automne au premier printemps (février et mars). Très commun partout dans la région du chêne où il vole autour des buissons de cet arbre. Martigny, Branson, Follatères, Saillon, Sion, Sierre, Salquenen, etc.

Obs. Les auteurs disent que ces papillons éclosent déjà en automne et hivernent. C'est possible et même probable, dit M. de Rougement, car les papillons que l'on prend au printemps sont en général déjà défraîchis. Il fait pourtant observer que ceux qu'il a obtenus ex larva lui sont éclos en février.

**Gen. Exapate Hb. 1818.**

**Duratella** Heyd. Mitth. I, p. 190 ♂ ; Frey ibid. III, p. 478 ♂.

Ch. en juillet sur les conifères, surtout sur le mélèze. Pap. en automne. Très rare. Sur le Simplon en novembre, entre l'hospice et le village (de R.).

**Ignotella** de Rougement, nov. sp.

Ch. verdâtre à tête et écusson roux, en juillet et août, sur *Thalictrum foetidum*. Pap. en novembre, un seul ex. ♀. Les ailerons de ce papillon sont à peine plus développés que ceux de la *Duratella* ♀, mais ils sont d'un beau blanc, pointillé de noir. Très rare. Pâturages de la région alpine, près de Saas-Fée (de R.). *Obs.* M. de Rougemont dit que son papillon a voyagé de musée en musée jusqu'à Vienne, mais qu'il n'a été reconnu nulle part. Dès lors, comme c'est un *Exapate*, sans hésitation possible, et que ce genre ne contient que deux espèces, il s'est décidé à lui donner un nom quand même le ♂ n'en a pas encore été découvert. Il ajoute que si quelqu'un se décidait à aller à Saas-Fée exprès pour y chercher la chenille (pas le papillon puisqu'il éclôt en novembre), il se ferait un plaisir de lui fournir l'indication exacte de l'endroit où il l'a trouvée.

**Gen. Anisotænia Steph. 1829**

(+ **Isotrias Meyr 1895**)

**Hybridana** Hb. 238. Fingalana Mill.

Ch. sur *Quercus*, *Cratægus*, *Acer campestre*, etc. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Assez rare. Région chaude. Gamsen (And.) ; Viège (Bent.) ; au-dessus de Plan-Cerisier, M<sup>t</sup> Ravoire, Salquenen.

a) **var. Pedemontana** Staud. Berl. e. Z. 1870 p. 275.

Ailes antér. presque unicolores, foncées.

Macugnaga (Staud.).

**Rectifasciana** Hw. 465. Albulana Tr. Hybridana Wk.

Ch. sur l'aubépine, le chêne, l'érable, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Gamsen (A.) ; environs de La Croix, Salquenen.

**Ulmiana** Hb. 278 ♂. Areolana Hb. 279 ♀. Fasciana Wallgr.

Ch. en mai et juin sur *Aquilegia vulgaris*, *Ranunculus Ficaria*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Environs de La Croix.

## B. Conchylinae (Phaloniinae).

### Gen. *Loxopera* Steph. 1829.

**Francillana** F. E. S. III, 2 p. 264. Flagellana HS.

Ch. en août et septembre sur *Daucus Carota* dans la semence, etc. Pap. de juin en août. Rare. Région chaude. Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

### Gen. *Conchylis* (Tr. 1829) Ld. (*Phalonia* [Hb.] Meyr.).

**Dubitana** Hb. 71.

Ch. sur les fleurs de *Senecio Jacobæa*, *Cirsium*, *Picris hieracioides*, *Hieracium umbellatum*, etc. Pap. en mai et juin, puis en août. Rare. Plaine et alpes jusqu'à 2000 m. Près La Furka, M<sup>t</sup> Ravoire, La Forclaz.

**Posterana** Z. Is. 1847, p. 740. Ambiguana Tr.

Ch. en juin et juillet, puis en automne, vivant des fleurs et des graines de *Lappa*, *Centaurea Jacea*, *Cirsium lanceolatum*, *Carduus*, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Pas très rare, mais n'appartient qu'à la région chaude; il vole le soir sur les fleurs de chardons. Près de Sion (Lah.); environs de La Croix, Salquenen.

**Pallidana** Z. Is. 1847, p. 742. Albicapitana Cook.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. M<sup>t</sup> Chemin (F.); il volait en assez grande abondance au commencement



de juillet 1904 au haut de la forêt de Blummett (val de Tourtemagne) entre 1900 et 2100 m. en ex. très grands (de R.).

**Gratiosana** Lah. Tort. p. 45, N<sup>ro</sup> 99, var. **Sedunensis** Lah.? *Curvistrigana* Wk.

Ch. en juillet et août sur les fleurs de *Solidago Virgaurea*. Pap. de juin en août. Environs de Sion (Lah.)

**Mussehliana** Tr. X, 3. 141. ? *Vectisana* Wk.

Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur *Alisma Plantago*, *Gentiana lutea*, etc., se nourrissant des fleurs et des graines. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Dans les pâturages secs près d'Aigle (Lah.); Salquenen (de R.).

**Callosana** HS. IV, p. 157; Hein 73.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Environs de Gamsen (A.).

**Perfusana** Gn. Gn. Ind. 64.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Col de Jaman et Panex au-dessus d'Ollon (Lah.)

**Sanguisorbana** HS. 412, VI, p. 158.

Ch. en août et septembre sur *Sanguisorba officinalis*, mangeant les fleurs et les semences. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.); environs de Sierre.

**Ambiguella** Hb. Tin. 153. *Roserana* Fröl.

Ch. au printemps et en été sur *Vitis vinifera* dans les grappes, mangeant fleurs et grains, aussi sur *Syringa vulgaris*, *Lonicera*, *Ligustrum*, etc. Pap. de mai en août. Trop commun et très nuisible à la vigne. Martigny, Fully, Sion, Sierre, Salquenen, Viège, etc.

**Hilarana** HS. 92, IV, p. 185. ? *Rhaeticana* Lah.

Ch. en juin et juillet sur *Artemisia campestris* dans les renflements des racines. Pap. en juillet et août. Rare. Région chaude. Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire (F.); Stalden, Salquenen (de R.).

**Woliniana** Schl. Stt. e. Z. 1868, p. 289.

Ch. en automne et au printemps sur *Artemisia Absinthium*, dans les tiges sèches des plantes. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (A.); Salquenen (de R.).

**Dipoltella** Hb. Tin. 345. Margaritana Hw. Dipoltana Tr.

Ch. en automne et au printemps sur *Achillea millefolium*, *Chamomilla*, mangeant les fleurs et les semences. Pap. pendant toute la belle saison. Rare. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

**Zephyrana** Tr. VIII, 127. Marmoratana Curt.

Ch. en automne et au printemps dans les racines et les tiges d'*Eryngium*, *Gnaphalium arenarium*,<sup>1)</sup> etc. Pap. en avril et mai, puis en août. Rare. Près d'Aigle (Lah.).

**Purgatana** Tr. X, 3, 148.

Ch. inconnue. Pap. d'avril en juin. Rare. Endroits secs. Environs d'Aigle (Lah.).

**Rutilana** Hb. 249. Purpurella Coqueb.

Ch. de mars en mai sur *Juniperus communis*. Pap. de mai en juillet. Répandu dans les alpes, mais pas commun; il vole autour des buissons de genévriers. Entre Gruben-dessous et Gruben-dessus vers 2200 m. en juillet 1903 (de R.); Zermatt (Frey); Mt Ravoire, Mt Chemin.

**Aurofasciana** Mn. z. b. V, 1855, p. 757. Valdensiana HS.

Ch. dans les tiges florales de *Gentiana acaulis*, d'où elle descend dans la racine, et se chrysalide au collet de la tige. Pap. en juillet et août. Très rare; il vole autour du *Juniperus nana* dans les Alpes. Environs de Salquenen de (R.).

**Aleella** Schulz. Naturf. IX, p. 106. Tesselana Hb.

---

<sup>1)</sup> *Helichrysum arenarium* DC, espèce étrangère, de la flore française de l'Est. Note de l'Edit.

Ch. en automne et au printemps dans les tiges de *Picris hieracioides*. Pap. de mai en août. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Martigny et ses environs, Salquenen.

**Hartmanniana** Cl. Ic. 4, 10. Baumanniana Schiff.

Ch. dans les racines des scabieuses et peut-être aussi des graminées. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Dans les prairies de la plaine et des sous-alpes, mais ne s'élève pas très haut. Martigny, La Croix, La Forclaz, Trient, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Decimana** Schiff. S. V. 317. Allionana F.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Assez répandu, mais partout assez rare. En Valais (Bent.) Salquenen (de R.).

**Badiana** Hb. 147. Rubigana Tr.

Ch. en automne et au printemps dans les tiges de *Lappa*, *Orobis niger*, etc. Pap. pendant toute la belle saison. Assez commun. Clairières des forêts. Alpes au-dessus de Bex (Lah.).

**Deutschiana** Zelt. Ins. Lap. 981. Lutulentana HS.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région montagneuse. Au pied de la Dent du Midi (Lah.); environs de Sion et de Sierre (P.).

**Kindermanniana** Tr. VIII, 276, X, 3, 141.

Ch. en mai et juin dans les pousses de l'*Artemisia campestris*, etc. Pap. en juin et juillet. Très rare. Environs de Gamsen (A.); coteau de Ravoire, Salquenen.

**Smeathmanniana** F. Sp. 278. Fabriciana Hb. 149.

Ch. en automne et au printemps sur *Achillea millefolium*, *Anthemis*, etc., mangeant les fleurs et les semences. Pap. pendant toute la belle saison. Très répandu dans la région chaude. Haut-Valais (A.); Sierre, Salquenen.

**Richteriana** F. R. 40, 3, p. 92.

Ch. inconnue. Pap. d'avril en juin. Il vole autour des armoises, dans les vignes de Sion en septembre (Lah.).

Obs. On pourrait croire qu'il a deux générations.

**Heydeniana** HS. 369, IV, p. 187.

Ch. en juin sur les fleurs d'*Anthemis* et d'*Artemisia campestris*. Pap. de juin en août. Rare. Coteaux de la région inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, M<sup>t</sup> Ravoire.

**Roseana** Hw. Lep. Br. p. 401. Rubellana Hb. Dip-saceana Dup.

Ch. en automne et au printemps sur *Antirrhinum*, *Linaria*, *Dipsacus*, *Lappa*, etc., mangeant fleurs et semences. Pap. de mai en juillet. Pas rare à Bex (Lah.); Viège (Bent.).

**Ciliella** Hb. Tin. 180. Ruficiliana Hw. Subroseana Wk.

Ch. sur *Bellis perennis*, *Gentiana verna*, *Primula farinosa*, *Linaria*, etc., mangeant fleurs et semences. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Pas commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. La Croix, Branson, Salquenen.

**Purpuratana** HS. 81, IV, p. 186. Ostrinana Gn.

Ch. en été, mangeant les fleurs de *Chondrilla Juncea*. Pap. en mai, puis en juillet et août. Rare. Environs d'Aigle (Lah.)

### **Gen. Euxanthis (Hb. 1818) Meyr.**

**Pareyssiana** Dup. Sup. IV, 83, 9, p. 415. Insequana Ev.

Ch. d'août au printemps suivant sur *Jurinea*,<sup>1)</sup> etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (And.).

---

<sup>1)</sup> Voir la note, page 146

**Hamana** L. S. N. X, 530. *Diversana* Hb. Vög. 39.  
Ch. en avril et mai sur *Ononis repens*, *Trifolium*,  
*Carduus*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. Plaine et  
sous-alpes. Branson, Martigny, La Croix, M<sup>t</sup> Ravoire,  
M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen au réflecteur.

a) **var. Diversana** Hb. Vög. et Schm. 40. Avec les  
ailes antérieures un peu plus écrites en brun.  
Avec le type. Branson, coteau de Ravoire.

**Zegana** L. S. N. XII, 876. *Hamana* Cl.  
Ch. en automne et au printemps autour des sca-  
bieuses et des centaurées, etc. Pap. de juin en août.  
Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Envi-  
rons de Martigny, Branson, Salquenen au réflecteur.

**Straminea** Hw. Lep. Br. p. 401. *Tischerana* Tr.  
*Sudana* Dup.

Ch. pendant l'été sur *Artemisia campestris*, *Centaurea Jacea*, etc. Pap. en mai et juin, puis en septembre  
et octobre. Pas commun. Région inférieure. Martigny,  
La Croix, Sion, Sierre, Ganter.

**Angustana** Hb. 74. *Cruentana* HS.

Ch. en automne et au printemps sur *Achillea millefolium*, *Erica vulgaris*, *Origanum*, *Solidago*, etc. Pap.  
en juillet et août. Un peu partout, de la région aux  
hauts pâturages (2400 m.), mais nulle part commun;  
il vole plutôt isolé. Haut-Valais (A.); environs de Sion,  
Salquenen, val de Tourtemagne.

### **Gen. Phtheocroa Steph. 1829**

**(Commophila Hb.) Meyr.**

**Rugosana** Hb. 82. *V. albana* Don.

Ch. en automne et au printemps, vivant de fleurs et  
de baies de *Bryonia dioica*. Pap. en juin. Rare. Dans  
la région inférieure. Près du château de La Bâtiaz.

**Sodaliana** Hw. Lep. Br. 436. *Amandana* HS.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Très rare et localisé. Région inférieure. Environs de Gamsen (And.); en Valais (Rebel).

**Schreibersiana** Fröl. Ent. Tort. N<sup>ro</sup> 114. Lediana Schiff.

Ch. en automne et au printemps sur divers peupliers, *Prunus Padus*, *Ulmus*, etc. Pap. en mai et juin. Pas commun. Dans la région inférieure. Environs de Martigny, Salquenen.

## C. Olethreutinæ (Grapholithinæ).

### **Gen. Evetria Hb. 1818. (Retinia Gn. 1845).**

**Duplana** Hb. 229 230. Spadiceana Dup.

Ch. d'août au printemps suivant dans les pousses de *Pinus silvestris*. Pap. en avril et mai. Pas très rare. Dans la région chaude. Haut-Valais (And.); Sion, Sierre, bois de pins, au-dessus du village de Salquenen.

**Posticana** Zett. Ins. Lap. 982. Mulsantiana Ratz.

Ch. dans les jeunes pousses de *Pinus silvestris*. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région inférieure. Environs de Sierre (P.); Gruben en 1904 (de R.).

**Pinivorana** Z. Is. 1846, p. 225.

Ch. inconnue, mais probablement sur les pins. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans la région chaude inférieure. Salquenen (de R.).

**Turionana** Hb. 220-221. Turionella Wk.

Ch. de l'automne au printemps dans les pousses de *Pinus silvestris* et *Abies*. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région des conifères. Haut-Valais (And.).

**Buoliana** Schiff. S. V. p. 128. Xylosteanana et Gemmana Hb.

Ch. de l'automne au printemps dans les pousses de *Pinus silvestris*. Pap. en juin et juillet. Rare. Région chaude inférieure. Sion, Sierre (P.); Salquenen (de R.).

**Resinella** L. S. N. X. 539. Resinana Tr. Obesana Lah.

Ch. vivant de la résine de *Pinus silvestris*. Pap. en juin et juillet. Rare. Région chaude inférieure. Environs de Sion et de Sierre (P.); Salquenen (de R.).

**Gen. Olethreutes Hb. 1818 (Penthina Tr.,  
Sericornis Tr.)**

**Salicella** L. S. N. X. 536. Salicana Schiff.

Ch. en mai et juin sur *Populus*, *Salix alba*, *caprea*, etc. Pap. de juin en août. Assez commun. Dans la région des arbres à feuilles. Martigny, M<sup>t</sup> Chemin, M<sup>t</sup> Ravoire, Branson, Plan-Cerisier, Salquenen.

**Semifasciana** Hw. Lep. Br. p. 431. Acutana Frr. Elutana Dup.

Ch. en mai et juin sur *Salix caprea* et *viminialis*, d'abord dans les chatons. Pap. en juillet et août. Assez rare. Région des arbres à feuilles. La Croix.

**Scriptana** Hb. 110. Hartmanniana L. N<sup>ro</sup> 1322.

Ch. en juin et juillet sur *Salix*. Pap. en juillet et août. Pas rare. Dans la région des arbres à feuilles. La Croix (W.).

**Capreana** Hb. 250. Moestana Wck.

Ch. au printemps sur *Betula*, *Salix caprea*, etc. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (And.), environs de Martigny.

**Corticana** Hb. 13. Picana Fröl. Capreana Dup.

Ch. d'avril en juin sur les jeunes pousses de *Betula*, *Salix purpurea* et *caprea*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure, sur les troncs du saule marceau. Martigny, Fully, M<sup>t</sup> Chemin.

**Betulætana** Hw. Lep. Br. p. 432. Leucomelana Gn.

Ch. au printemps dans les feuilles roulées de *Betula alba*. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région inférieure. La Croix, Plan-Cerisier.

**Sauciana** Hb. 305. Grevillana Curt. Incarnatana Dup.

Ch. en mai sur *Vaccinium Myrtillus*. Pap. de juin en août. Pas rare. Alpes du Valais (Lah.) ; Haut-Valais (And.) ; Simplon, Saas, Gruben, 1904.

**Variegana** Hb. 14. Cynosbatella Wk.

Ch. au printemps sur *Rosa*, *Prunus spinosa*, *Cratægus*, *Sorbus*, *Pirus*, *Salix*, etc. Pap. de juin en août. Commun. Plaine et région montagneuse jusqu'à 1200 m. Martigny, La Croix, M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Pruniana** Hb. 15. Fasciana Sc. Pullana Wd.

Ch. en avril et mai sur *Cratægus et Prunus spinosa*. Pap. de juin en août. Commun en juillet dans toutes les haies d'aubépine. Sion, Sierre, Viège, Salquenen.

**Ochroleucana** Hb. 204. Tripunctana Wd., Gentiana Dup.

Ch. au printemps sur les rosiers. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (And.) ; Sierre, coteau de Lens.

**Oblongana** Hw. Lep. Br. p. 433 ♀. Marginana Hw. l. c. ♂. Sellana Gn.

Ch. en automne et au printemps sur *Dipsacus*, *Cirsium oleraceum*, mangeant les fleurs. Pap. de juin en juillet. Rare. Dans la région inférieure. Aigle (Lah.) ; Haut-Valais (And.) ; environs de Sion (P.).

**Gentiana** Hb. Gesch. VII, Tort. II. Gentianana Tr.

Ch. en automne et au printemps sur les fleurs de *Gentiana germanica*, *Dipsacus*, etc. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. Martigny, Branson, M<sup>t</sup> Chemin, La Forclaz.

**Roseomaculana** HS. 163, IV p. 229. Lienigiana Hein.



Ch. en avril et mai sur *Pyrola secunda* et *rotundifolia*. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (And.) ; au-dessus de M<sup>t</sup> Chemin, sur le Simplon.

**Profundana** F. Mant. 229. Porphyra Hb.

Ch. au printemps dans les feuilles roulées de *Prunus Padus*, *Quercus*, etc. Pap. de juin en août. Pas commun. Dans la région inférieure des arbres à feuilles. Haut-Valais (And.) ; Martigny-Combe ; du Valais (de R.).

**Fuligana** Hb. 109. Ustulana Hw.

Ch. en automne et au printemps sur les vieilles tiges d'*Impatiens Noli-tangere* et sur *Stachys sylvatica*. Pap. pendant toute la belle saison. Pas rare. Dans la région inférieure. Aigle (Lah.) ; Martigny, M<sup>t</sup> Chemin.

**Textana** H.-G. 307-9. Norvegicana Schöyen.

Ch. dans les pousses de *Scabiosa arvensis*. Pap. en juillet. Rare. Plaine et sous-alpes. Val d'Illeiez (Lah.) ; Salquenen (de R.).

**Arcuella** Cl. Jc. 10, 8. Arcuana L.

Ch. en automne et au printemps dans les bois de noisetiers. Pap. de mai en juillet. Rare, mais un peu partout. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. La Croix, Branson.

**Arbutella** L. S. N. X, 538. Arbutana Hb.

Ch. au printemps dans les feuilles roulées de *Vaccinium Vitis-Idæa* et *Arbutus Uva-ursi*. Pap. de mai en juillet. Rare. Région forestière et montagnaise jusqu'à plus de 2100 m. Haut-Valais (And.) ; sur le Simplon, Salquenen.

**Mygindana** Schiff. S. V. p. 131. Flammeana Hb.

Ch. au printemps sur *Vaccinium uliginosum* et *Vitis-Idæa*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région sous-alpine. Grimsel (Bent.) ; Haut-Valais = *individus très foncés* = (And.) ; M<sup>t</sup> Chemin, La Forclaz, Salquenen.

**Rufana** Sc. Ent. Carn. N<sup>ro</sup> 591. Rosetana Hb.

Ch. dans les racines de *Tanacetum* et *Artemisia campestris*. Pap. de juin en août. Pas rare. En Valais (Bent.); sur les bords de la Drance à Rossetan (F.); Salquenen (de R.).

a) **var. Purpurana** Hw. Lep. Br. p. 400. Ailes antérieures rosacées ou ferrugineuses.

Avec le type. Sur les bords de la Drance à Rossetan (F.); Salquenen (de R.).

**Striana** Schiff. S. V. 129. Rusticana et Fasciolana Hb.

Ch. en mai et juin dans les racines de *Leontodon* et *Stachys sylvatica*. Pap. en juin et juillet. Pas rare dans la région chaude. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Branderiana** L. S. N, X. 531. Maurana Hb.

Ch. au printemps sur le tremble. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les environs de Viège (M.-D.); Sierre.

**Siderana** Tr. X, 3-81.

Ch. en mai et juin sur *Spiræa Aruncus*, etc. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région forestière. Au Gottra sur le M<sup>t</sup> Chemin.

**Metallicana** Hb. 68. Alternana Wk. Daleana Doubl.

Ch. en mai et juin sur *Vaccinium Myrtillus*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Dans la région sous-alpine. Val d'Illiez, Champéry (Lah.); vallée de Tourtemagne en juillet 1904; col d'Orzival, 2800 m. (de R.).

**Stibiana** Gn. Ind. 24. Micana Tr.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (And.).

**Scoriana** Gn. Ind. 24. Metalliferana HS. 204.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Rare. Dans les hauts pâturages de la région alpine de 2200 à 2700 m. Furca, Loèche-les-Bains, Anzeindaz, Zermatt, Riffelberg, Orzival sur Grimentz, Meidenalp, etc. Il varie beaucoup.

**Palustrana** Z. Is. 1846 p. 630. Olivana Dup. Disertana HS.

Ch. en mai dans la mousse. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région alpine. Sur le Simplon (Jäggi).

**Schulziana** F. Gen. 293. Pinetana Hb. Bentleyana Don. Zincknana Tr.

Ch. au printemps dans la mousse et sur *Pinus silvestris*. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région alpine jusqu'à 2100 m. et plus. Zermatt (Frey); La Forclaz, Mt Chemin, Zermatt (de R.); plateau du Simplon, Riffelalp.

**Spuriana** HS. 334, IV p. 211. ? Andereggana Gn. Ind. 27.

Ch. sur *Dryas octopetala*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région montagnaise. Evolène, Zermatt.

**Micana** Hb. 28! Olivana Tr.

Ch. en automne et au printemps, polyphage sur les plantes basses. Pap. en juin et juillet. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (And.).

**Boisduvaliana** Dup. IX, 262, 8 p. 507.

Ch. au printemps sur *Pinus Abies*. Pap. en juin et juillet. Assez rare, Dans la région des conifères. Haut-Valais (And.); Mt Chemin.

**Rivulana** Sc. Ent. Carn. N<sup>ro</sup> 600. Conchana Hb.

Ch. en mai et juin, puis en septembre sur *Alnus* et *Genista tinctoria*. Pap. en mai, puis en juillet et août. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1500 m. dans les endroits humides. Sur le Simplon. Salquenen.

**Umbrosana** Frr. 318, 1. IV, p. 46.

Ch. commune sur l'aune. Pap. en mai et juin. Très rare. Dans la région inférieure. Salquenen (de R.).

**Urticana** Hb. 65.

Ch. en mai et juin sur les arbres forestiers et les plantes basses. Pap. en juillet et août. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (And.).

**Lacunana** Dup. Sup. IV, 24, 5. Micana Hw. Urticana Dup.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur *Anthriscus sylvestris*, *Gentiana asclepiadea*, *Primula officinalis*, *Mentha aquatica* et autres plantes basses. Pap. en mai et juin puis en juillet et août. Assez commun partout. Prairies et taillis jusqu'à 1600 m. M<sup>t</sup> Chemin, La Forclaz, Salquenen.

**Lucivagana** Z. Is. 1846 p. 229. Lucana Gn.

Ch. en avril et mai sur *Sonchus*. Pap. de mai en août. Pas rare. Dans la région inférieure. Au pied de la montagne d'Aigle (Lah.) ; M<sup>t</sup> Chemin, près de Bérissal, Gruben.

**Rurestrana** Dup. Sup. IV, 84, 6 ; HS. 211-2. Rupes-trana Hein.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny, Salquenen.

**Cespitana** Hb. 244-5. Gramineana Curt. Flavipalp-ana HS.

Ch. inconnue. Pap. pendant toute la belle saison. Commun. Plaine et région montagneuse. Marais d'Aigle (Lah.) Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny, coteau de Ravoire, Salquenen.

**Bipunctana** F. E. S. 250.

Ch. en mai sur *Vaccinium Myrtillus* et *Vitis-Idæa*. Pap. de juin en août. Pas commun. Dans la région montagneuse. Haut-Valais (And.) ; M<sup>t</sup> Chemin, La Forclaz, vallée de Tourtemagne.

**Charpentierana** Hb. 281.

Ch. en avril et mai sur *Aconitum*. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région alpine jusqu'à 2200 m. Alpes de Zermatt (Frey) ; La Forclaz.

**Fulgidana** Gn. Ind. 25. Textana Dup., Gigantana HS.

Ch. inconnue. Pap. en juin. Assez rare. Dans la région forestière. Villeneuve (Lah.) ; Haut-Valais (And.) ; Bouveret, Port-Valais, Vouvry, M<sup>t</sup> Chemin.

**Achatana** F. Mant. 239. Marmorana Hb.

Ch. en mai et juin sur *Cratægus oxyacantha*, *Prunus spinosa*, *Pirus*, etc. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (And.) ; environs de Martigny (F.) ; Salquenen (de R.).

**Antiquana** Hb. 213-4. Quadrimaculana Wd.

Ch. en avril et mai dans les tiges de *Stachys sylvatica* et *arvensis*. Pap. de juin en août. Rare. Région inférieure. Bex (Lah.) ; Haut-Valais (And.).

**Gen. Polychrosis Rag. 1894. (Endemis Wck.**

**Cat. Ed. II.)**

**Andereggiana** HS. (non Gn.) 116 (1852), IV p. 225. Kreithneriana Horn.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Haut-Valais (And.).

**Botrana** Schiff. S. V. p. 131. Rosmarinana Mill., Vitivorana Ril.

Ch. de juin en août sur *Vitis vinifera*, nuisible à la grappe. Pap. de mai en juillet. Assez commun, dans la région des vignes. Viège (M.D.) ; Martigny, Fully, Sion, Sierre.

**Artemisiana** Z. Is. 1847 p. 27. Trifasciana HS.

Ch. de juin en septembre en deux générations sur *Anchusa officinalis* et *Echium vulgare* ; d'après Mill. sur *Odontites lutea* et d'après Frey dans les capitules fleuris d'*Allium oleraceum*. Pap. en avril et mai, puis en juin et juillet. Rare. Dans la région chaude inférieure. Coteau de Ravoire, Plan-Cerisier.

**Gen. Acroclita Ld. 1859.**

**Consequana** HS. var. **Littorana** Const. An. S. Fr. 1865 p. 190. Ailes antérieures blanchâtres, plus distinctement marquées.

Ch. inconnue. Pap. en juillet. Haut-Valais (And.).

**Gen. Steganoptycha Steph 1829 (Enarmonia  
[Hub.] Mayr.).**

**Delitana** F. R. 65, 2 p. 185. Lætana Stgr.

Ch. en mai et juin sur les Papilionacées. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (And.).

**Pauperana** Dup. IV, 64, 10.

Ch. inconnue, mais probablement sur Rosa. Pap. en avril et mai. Rare. Dans la région inférieure. Près de Sierre (Paul).

**Nigromaculana** Hw. Lep. Br. p. 436. Albana Wd.

Ch. en mai sur *Salix caprea*, etc. Pap. en juin et juillet. Rare. En Valais (Paul).

**Ramella** L. S. N. X, 540. Triquetrana Hb. 280, 366.

Ch. en mai et juin dans les chatons du bouleau et du tremble. Pap. en juillet et août. Rare. En Valais (Paul).

**Oppressana** Tr. X, 3. 195,

Ch. en mai sur *Populus nigra*, etc. Pap. de juin en août. Assez rare. En Valais (Paul).

**Diniana** Gn. Ind. p. 33. (1845). Pinicolana Z. (1846).

Ch. en mai et juin sur *Pinus Larix* et *Cembra*. Pap. en juillet et août. Très commun dans les montagnes et nuisible, heureusement un peu localisé. Haut-Valais (And.); La Forclaz, Chandolin, Ponchette, Simplon, Zermatt, en abondance en juillet 1899 entre Täsch et Zermatt (de R.).

**Corticana** Hb. 209, 270. Communana Wd,

Ch. en mai sur le chêne. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la région chaude inférieure. Plan-Cerisier, M<sup>t</sup> Ravoire, Branson, Sion, Sierre.

a) **ab. Adustana** Hb. 218. Taches lavées d'un brun ocracé ;

b) **ab. Steiniana** Sorh. Berl. e. Z. 1882 p. 141. Tache blanche dorsale interrompue à la base.

Ces deux formes se prennent çà et là avec le type.

**Rufimitrana** HS. 139, IV p. 220.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août, volant autour des pins. Rare. Plaine et alpes jusqu'à plus de 2000 m. Près de Viège (M.-D.).

**Ratzeburgiana** Ratz. Forsk. Ins. p. 227, t. 12, 3. Tenerana Dup.

Ch. sur les pousses du *Pinus Abies*. Pap. en juillet et août. Pas commun. Dans la région des forêts. Salquenen (de R.).

**Ustomaculana** Curt. B. E. VIII, t. 376. Dorsivittana HS.

Ch. en mai et juin sur *Vaccinium Vitis Idæa*. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.).

**Vacciniana** Z. Is. 1846, 248. Myrtillana West.

Ch. de juillet en septembre sur *Vaccinium Myrtillus* et *uliginosum*, *Berberis*, etc. Pap. en mai et juin. Pas rare dans les sous-alpes jusqu'à 1200 m. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

**Ericetana** HS. 136, IV p. 276. Cespitana Dup.

Ch. en août et septembre sur le tremble. Pap. de mai en août. Pas commun. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (A.); Zermatt (Frey); La Croix, Plan-Cerisier, Branson.

**Fractifasciana** Hw. Lep. Br. 466. Cuphana Dup.

Ch. en juin, puis en août et septembre sur les fleurs et les tiges des scabieuses. Pap. en mai, puis en juillet et août. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Martigny, Branson, Salquenen.

**Quadrana** Hb. 233.

Ch. de juillet en septembre en société sur *Knautia arvensis* et *Scabiosa*. Pap. d'avril en juillet. Assez rare. Plaine et alpes jusqu'à 2200 m. Gemmi, Simplon, M<sup>t</sup> Ravoire, Martigny, Salquenen.

**Resupinatana** Kenn. Iris XIII, p. 270. (Semasia).

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. En Valais (Rebel.).

**Mercuriana** Hb. 322. Monticolana Dup. Alticolana Steph.

Ch. en juin et juillet sur *Dryas octopetala*. Pap. en juillet et août. Rare. Régions sous-alpine et alpine, de 1200 à 2100 m. Alpes du Valais (A.); Gemmi (Rthb.); Anzeindaz (Lah.).

**Cruciana** L. F. S. N<sup>ro</sup> 1333. Augustana Hb. Excœcana. HS.

Ch. en mai et juin sur *Salix caprea*. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes. Haut-Valais (And.).

**Obtusana** Hw. Lep. Br. p. 453. Derasana Dup. Distortana Gn.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin, volant autour des châtaigniers. Pas commun. Région inférieure. Vouvry, Monthey, Martigny, Fully, Naters.

**Trimaculana** Don. Nat. Hist. XI, t. 369, 1. Lithoxylana Dup. Ulmariana Z.

Ch. sur l'orme. Pap. en juin et juillet. Très rare; plutôt dans la région chaude. Alentours de Sierre (Paul); Salquenen (de R.).

**Minutana** Hb. 73. Achatana Fr. Pædiscana Staud.

Ch. en mai et juin sur divers peupliers. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Martigny, Fully.

### **Gen. Gypsonoma Meyr. 1895.**

**Aceriana** Dup. Suppl. IV, 83, 12.

Ch. au printemps sur *Acer platanoides* et *campestris*, *Populus tremula*, plutôt sur les branches. Pap. en juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.



**Incarnana** Hw. Lep. Br. p. 435. Dealbana Fröl.

Ch. au printemps sur *Corylus*, *Populus tremula*, *Salix caprea*, d'abord dans les chatons, plus tard sur les feuilles. Pap. de juin en août. Pas commun. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; La Croix, Branson, Salquenen.

**Neglectana** Dup, Suppl. IV, 89, 3.

Ch. en avril et mai dans les chatons de *Salix caprea*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des arbres à feuilles. Environs de La Croix, M<sup>t</sup> Chemin.

### **Gen. Asthenia (Hb. 1818) Meyr.**

**Pygmæana** Hb. 89. Antenuana Fröl.

Ch. de juillet en septembre sur *Pinus Abies*. Pap. en printemps. Rare. Dans la région des conifères. Haut-Valais (A.) ; M<sup>t</sup> Chemin.

### **Gen. Pelatea Gn. 1845.**

**Festivana** Hb. 52 ; Dup. IX, 261.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Très rare. Plutôt dans la région chaude. Cinq ex. à Salquenen en 1901. Nouveau pour la Suisse.

### **Gen. Bactra Steph. 1829 (Aphelia Curt.).**

**Lanceolana** Hb. 80. Pauperana Curt. Signana HS.

Ch. de mai en août dans les touffes de Cypéracées, *Juncus*, etc. Pap. de juin en septembre ; il varie considérablement. Pas rare dans les pâturages marécageux de la plaine et des sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; Salvan (F.) ; vallée de Tourtemagne en juillet 1904 (de R.).

**Gen. Semasia (Steph. 1829) HS.**

**Hypericana** Hb. 28.

Ch. dans les pousses de l'*Hypericum perforatum*. Pap. pendant toute la belle saison. Assez commun. Plaine et région montagneuse jusqu'à 1800 m. Au-dessus de Plan-Cerisier, Mt Ravoire, Mt Chemin, Fully, Salquenen.

**Mirificana** Peyer. An. S. Fr. 1876, t. 12, f. 18 ; Frey Lep. p. 319.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Haut-Valais (A.) ; versant S. du Simplon (Frey).

**Æmulana** Schläg. Ber. 1849 p. 39. Latorana HS.

Ch. sur les fleurs et les semences de *Solidago Virgaurea* et d'*Aster Amellus*. Pap. en juin et juillet. Très rare. Régions chaude et moyenne. Salquenen, un seul ex. (de R.).

**Citrana** Hb. 185.

Ch. au printemps sur *Artemisia campestris*, *Achillea millefolium* et *Tanacetum*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Aigle (Lah.) ; Haut-Valais (And.) ; au-dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire.

**Pupillana** Cl. Ic. 11, 9. Absinthiana Hb.

Ch. en automne et au printemps, tiges et racines des *Artemisia campestris* et *Absinthium*. Pap. de mai en juillet. Rare. Région inférieure. Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Zermatt (Frey) ; Sierre, Salquenen, Stalden (de R.).

**Incana** Z. Is. 1846, 239.

Ch. en automne et au printemps sur les tiges de l'*Artemisia campestris*. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région des arbres forestiers. Sur le Simplon (Bent.) ; Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.).

**Aspidiscana** Hb. 256. Nebritana HS.

Ch. en automne et au printemps dans les tiges de *Linosyris vulgaris*, *Solidago Virgaurea*. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Plaine et alpes jusqu'à 2000 m. La Croix, Mt Ravoire, Salquenen.

**Conterminana** HS. 297, IV, p. 247. Cæcimakulana Dup.

Ch. de juin en août dans les pousses de *Lactuca sativa*, *virosa*, etc. Pap. en août et septembre. Rare. Région chaude. Haut-Valais (A.) ; Martigny, La Croix, Salquenen.

**Gen. Notocelia (Hb. 1818) Meyr. (Aspis Tr.)**

**Uddmanniana** L. F. S. Nro 1332. Achatana Hb. 49.

Ch. en avril et mai dans les pousses des ronces. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans les taillis de la région inférieure. La Croix, Mt Chemin, Salquenen.

**Suffusana** Z. Is. 1846 p. 211. Trimaculana Hw.

Ch. au printemps sur *Cratægus*, *Prunus spinosa*, *Pirus*, etc. Pap. de juin en août. Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.) ; Fully.

**Roborana** Tr. VIII, 30. Aquana Hb.

Ch. sur *Rosa*, *Salix*, *Pirus Malus*, *Prunus spinosa*, etc. Pap. de juin en août. Commun partout, dans les jardins, les haies. Martigny, Mt Chemin, La Croix.

**Gen. Epiblema Hb. 1818. (Pædisca Tr.)**

**Grandævana** Z. Is. 1846 p. 238. Tussilaginata HS.

Ch. en printemps sur *Tussilago Farfara* et *Petasites niveus*, dans les racines. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Dans le Val d'Illiez (Lah.) ; La Croix, Branson (W. et F.) ; dans un ravin à Binn, en nombre (de R.)

**Infidana** Hb. 296-8.

Ch. en mai et juin dans les racines de l'*Artemisia campestris*. Pap. de juillet en septembre. Rare. Haut-Valais (Zeller); au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen en grand nombre.

**Cana** Hw. Lep. Br. p. 456. Hohenwartiana Tr., Carduana Gn.

Ch. d'avril en juillet sur *Carduus*, *Cirsium lanceolatum*, *Centaurea Jacea*, *Scabiosa* et *Epilobium*. Pap. de juin en septembre. Assez rare. Dans les prairies sèches de la région forestière montagnaise. Alpes d'Aigle et d'Ollon (Lah.); Haut-Valais (A.); Viège (Bent.); au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

**Fulvana** Steph. Ill. IV. p. 123. Jaceana HS., Pupillana Hw. Ailes supérieures d'un jaune ocracé rougeâtre.

Ch. comme la précédente. Pap. de juin en septembre. Très rare. Dans la région forestière montagnaise. Haut-Valais (And.); coteau de Lens, Salquenen.

**Expallidana** Hw. Lep. Br. p. 469. Rufana Steph., Obumbratana Z.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Rare. Marais d'Aigle (Lah.); environs de Sion et de Sierre (Paul).

**Cæcimaculana** Hb. 27. Kollariana HS. 295.

Ch. en juin sur *Campanula*, *Epilobium*, *Artemisia campestris*. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région inférieure. Environs de Sion et de Sierre (Paul), Salquenen.

**Trigeminana** Steph. Ill. IV p. 94. Pœcilana Gn., Confusana HS.

Ch. inconnue. Pap. en mai. Rare. Ollon (Lah.); Haut-Valais (A.); du Valais (de R.).

**Graphana** Tr. X, 3. 96. Pierretana Dup.

Ch. inconnue. Pap. de juin en août. Il vole autour d'*Achillea* et de *Tanacetum*. Rare. Haut-Valais (A.)

**Nigricana** HS. 138, IV p. 220.

Ch. de septembre en mars sur *Pinus Abies* et *Picea*. Pap. d'avril en juillet. Assez rare. Dans la région des conifères. En Valais (P.); M<sup>t</sup> Chemin.

**Tedella** Cl. Ic. 10. 13. Comitana Schiff., Piceana Hb. 72.

Ch. au printemps et en été sur les conifères. Pap. pendant toute la belle saison. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. M<sup>t</sup> Chemin, M<sup>t</sup> Ravoire, La Forclaz, Arpillen, Grimentz.

**Proximana** HS. 127, IV p. 219. Distinctana Wk.

Ch. en avril et mai sur *Pinus Abies*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région des conifères. M<sup>t</sup> Chemin.

**Demarniana** F. R. 65, 3 p. 186. Naevana Steph.

Ch. dans les chatons des bouleaux et de l'aune. Pap. en juin et juillet. Assez rare. Environs de Sion et de Sierre (Paul).

**Couleruana** Dup. IX, 253, 8 p. 353. Rieseana HS.

Ch. sur *Teucrium montanum*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); coteau de Ravoire (F.); Salquenen en mai 1902 (de R.).

**Subocellana** Don. Nat. Hist. XI, T. 380, 1. Campoliliana Tr.

Ch. en automne sur *Salix caprea*. Pap. de mai en juillet. Pas commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1200 m. Martigny et environs, Salquenen.

**Nisella** Cl. Ic. 12, 6. Siliceana Hb. 196.

Ch. au printemps sur *Betula alba*, *Populus tremula* et *Salix*. Pap. de juin et août. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Sierre.

**Penkleriana** F. R. p. 198. Mitterbacheriana Dup.

Ch. en automne et au printemps dans les fleurs et les bourgeons de l'*Alnus* et de *Corylus Avellana*. Pap. en

juin et juillet. Assez rare. Dans les sous-alpes jusqu'à 1500 m. Haut-Valais (A.); Martigny, La Croix, Plan-Cerisier, Salquenén.

**Solandriana** L. S. N. X, 532. Semimaculana Hb. Ailes antérieures cendrées, avec la tache dorsale d'un brun roux étendue.

Ch. en automne et au printemps sur *Betula alba*, *Populus tremula* et *Corylus Avellana*. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Sierre (Paul).

a) **var. Sinuana** Hb. 212. Ailes antérieures d'un gris noir ou d'un brun roux, avec une tache dorsale triangulaire blanche. Haut-Valais (A.); vallée de Binn (de R.).

b) **var. Trapezana** F. Mant. 228. Ailes antérieures d'un gris noir ou brun roux, mais sans tache dorsale. En Valais (Paul); vallée de Binn (de R.).

**Bilunana** Hw. Lep. Br. p. 436. Cretaceana Hb. 318.

Ch. au printemps dans les chatons de bouleau et d'aune. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure et jusqu'ici seulement à Viège (M.-D.).

**Tetraquetrana** Hw. Lep. Br. p. 454. Frutetana Hb.

Ch. en automne et au printemps dans les feuilles roulées du bouleau et de l'aune. Pap. en mai et juin. Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion.

**Immundana** F. R. 53, 2 p. 138. Triquetrana Steph.

Ch. comme la précédente. Pap. en juin. Environs de Sion et de Sierre (P.); en Valais (de R.).

**Crenana** Hb. 242. Monachana F. R. 53.

Ch. en juin et juillet sur *Salix caprea*. Pap. en juillet et août. Rare. Dans la région sous-alpine vers 1600 m. La Forelaz, M<sup>t</sup> Chemin.

**Similana** Hb. Vög. 71. Bimaculana Don., Dissimilana Tr.

Ch. au printemps sur *Betula*, *Corylus*, *Alnus*, etc. Pap. de juillet en septembre. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); environs de Martigny.

**Tripunctana** F. Mant. 238. Ocellana Hb., Cynosbana Hw.

Ch. en mai et juin sur *Rosa*, etc. Pap. en juillet et août. Assez commun. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 mètres. Haut-Valais (A.); Martigny, Salquenen.

**Asseclana** Hb. 19. Similana Tr., Scutulana Dup.

Ch. en mai et juin sur *Betula*. Pap. en juillet et août. Pas rare. Dans les prairies de la région forestière. Haut-Valais (A.); M<sup>t</sup> Chemin.

**Mendiculana** Tr. X, 3. 87; HS. 146, IV p. 236.

Ch. inconnue. Pap. en juillet; il vole sur *Calluna vulgaris*. Rare. Près de l'hospice du Grimsel (Lah.); Haut-Valais (A.).

**Pflugiana** Hw. Lep. Br. p. 441. Scutulana Tr., Novana Gn.

Ch. en automne et au printemps dans les tiges de *Carduus nutans*, *Cirsium lanceolatum*, *Carlina vulgaris*, etc. Pap. de mai en juillet. Rare. Haut-Valais (A.); au-dessus de Plan-Cerisier, coteau de Ravoire, Fully.

a) **var. Alsaticana** Pey. An. S. Fr. 1872 p. 10. Plus clair.

Avec le type et plus commun. La Croix, Branson, M<sup>t</sup> Chemin.

**Luctuosana** Dup. IX, 252. Cirsiana Z., Scutulana F.

Ch. en automne et au printemps dans les tiges de *Cirsium palustre*, *Carduus acanthoides*, *Senecio Jacobæa*, etc. Pap. de mai en août. Répandu, mais isolément et rare. Dans la région montagnaise. Haut-Valais (A.); Branson.

**Simploniana** Dup. IX, 248. Sublimana HS.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet; il vole autour de *Calluna vulgaris* et de *Betula*. Pas commun. Haut-Valais (A.); sur le Simplon (Gn., Dup.); dans le Val d'Illeiez vers 1500 m. (Lah.); Salquenen.

**Brunnichiana** Fröl. Ent. Tort. N<sup>ro</sup> 93. Profundana Hb.

Ch. en automne et au printemps dans les tiges et les racines de *Tussilago Farfara*, *Lappa*, *Petasites*, etc. Pap. de mai en juillet. Assez répandu et montant assez haut. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m.; il vole en général sur les talus humides au bord des chemins. Martigny, Branson, Plan-Cerisier, Grimentz; forêt de Tête-Noire, fin juin 1905.

**Fœnella** L. S. N. X, 536. Tibialana Hb., Fœneana Tr.

Ch. en automne et au printemps dans les racines et dans les tiges de l'*Artemisia vulgaris*. Pap. en juin et juillet. Rare. Région inférieure. Environs de Viège (M.-D.); coteau de Ravoire, au-dessus de Plan-Cerisier.

**Gen. Grapholitha (Tr. 1829) Hein. (Laspeyresia [Hb] Meyr.)**

**Albersana** Hb. 224. Rhediella Steph.

Ch. sur les chèvrefeuilles. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région forestière. Salquenen (de R.).

**Wœberiana** Schiff. S. V. 126. Ornatana Hb.

Ch. en automne et au printemps sous l'écorce de *Prunus armeniaca*, *Cerasus* et *domestica*, *Amygdalus* et *Pirus Malus*. Pap. de mai en août. Commun et nuisible. Région des arbres fruitiers. La Croix, Martigny, Sion, Sierre, Salquenen.

**Funebrana** Tr. X, 3. 116.



Ch. en automne dans les fruits de *Prunus domestica* et *spinosa*. Pap. en mai et juin. Pas rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion, Salquenen.

**Nigricana** Steph. Ill. IV p. 101. *Nebritana* Z., *Tenebrosana* Z.

Ch. de juin en août dans les gousses de *Colutea arborescens* et de *Pisum sativum*. Pap. en mai et juin. Rare. Région chaude inférieure. Follatères de Fully.

**Nebritana** Tr. VIII, 209; ? *Gilviciliana* Stgr.

Ch. en août et septembre, vivant dans les gousses de *Colutea arborescens* et de *Pisum sativum*. Pap. en mai et juin. Assez rare. Région chaude des cultures. Haut-Valais (A.); Follatères de Fully, La Croix, Plan-Cerisier.

**Roseticolana** Z. Stett. e. Z. 1849, 253. *Tenebrosana* Dup.

Ch. de juin en août, vivant des graines de *Pisum sativum*, *Vicia sylvatica*, *Orobis tuberosus* et *Lathyrus sylvestris*. Pap. en mai et juin. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. Châtaigneraies de Fully.

**Zebeana** Ratz. Forst. Ins. p. 231, t. 15, 6.

Ch. en mars et avril, sous les écorces du mélèze. Pap. en juin et juillet. Très rare. Dans la région des conifères, vers 1600 m. La Forclaz, M<sup>t</sup> Chemin.

**Cæcana** Schläg. Ber. 1847 p. 234. *Cæcana* HS.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin, volant autour d'*Ononis spinosa* et *Onobrychis*. Rare. Haut-Valais (A.) Saillon en mai 1905 (de R.).

**Succedana** Fröl. Ent. Tort. N<sup>ro</sup> 224. *Asseclana* Hb.

Ch. en automne sur *Cytisus nigricans*, *Genista germanica* et *sagittalis*, mangeant les fruits dans les gousses. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. Aigle (Lah.); Haut-Valais (A.); Salvan, Salquenen.

a) **var. Ulicetana** Hw. 458. *Lanceolana* Wd., *Consequana* Z. et *Micaceana* Const.

Ailes antérieures obscures, presque unicolores d'un brun basané.

Avec le type. Haut-Valais (And.).

**Servillana** Dup. IX, 262, 6.

Ch. dans les branches tuméfiées du saule marceau. Pap. en juin. Très rare. Dans la région chaude inférieure. Plusieurs ex. de Salquenen (de R.).

**Strobilella** L. S. N. X, 539. *Kollarana* Hb.

Ch. en automne et au printemps dans les fruits de *Pinus Abies* et *Picea*. Pap. en avril et mai. Pas rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.); M<sup>t</sup> Chemin.

**Corollana** Hb. 282. *Heegerana* Wk.

Ch. de septembre en mars sur *Populus tremula*. Pap. en mai et juin. Assez rare. Dans la région des arbres à feuilles. En Valais (Paul).

**Scopariana** HS. 324, IV p. 274. *Lathyrana* Fröl.

Ch. en mars et avril sur *Genista tinctoria*, *Spartium scoparium*. Pap. en avril et mai. Assez rare. Dans la région forestière. En Valais (A.).

**Compositella** F. S. E. 663. *Gundiana* Hb., *Composana* Dup.

Ch. inconnue. Pap. de mai en juillet. Pas rare. Dans les haies d'aubépine jusqu'à 1500 m. Haut-Valais (A.); environs de La Croix; Salquenen.

**Duplicana** Zett. Ins. Lap. 987. *Interruptana* HS.

Ch. en automne et au printemps sous l'écorce de *Juniperus communis*, *Pinus Abies* et *Picea*. Pap. en juin et juillet. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1800 m. Près de Zermatt (Frey); Salquenen, Stalden (de R.).

**Perlepidana** Hw. Lep. Br. 458. *Loderana* Tr., *Lathyrana* HS.

Ch. sur *Orob. niger*. Pap. en mai et juin. Pas rare. Environs de Sion et de Sierre (Paul); au-dessus de Plan-Cerisier.

**Fissana** Fröl. En. Tort. N<sup>ro</sup> 205. Divisana Dup., Dorsana Tr.

Ch. en automne et au printemps sous l'écorce des jeunes branches de conifères. Pap. en mai et juin. Pas rare. Dans la région forestière. M<sup>t</sup> Ravoire, Arpilles, La Forclaz, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Inquinatana** Hb. 43.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Rare. Environs de Sion et de Sierre (P.).

**Dorsana** F. S. E. p. 654. Lunulana Hb., Jungiana Fröl.

Ch. de juillet en septembre dans les gousses de *Pisum*, *Orob. tuberosus* et *Vicia sylvatica*. Pap. en mai et juin. Assez rare. Dans la région chaude inférieure La Croix, M<sup>t</sup> Chemin, Stalden.

**Orobana** Tr. VIII, 226. Arcigera Tgst., Dorsana Wk.

Ch. inconnue. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Rare. Dans la région chaude inférieure. Au-dessus de Plan-Cerisier, Branson, Salquenen.

**Coronillana** Z. Is. 1846, 251. Argyrana Tr.

Ch. en août et septembre sur *Coronilla varia*. Pap. en mai et juin. Rare. Dans la région chaude inférieure. En Valais (Paul).

**Aurana** F. S. E. p. 653. Mediana Hb.

Ch. en automne, vivant des fruits d'*Heracleum Sphondylium*. Pap. de mai en juillet. Rare. Dans la région inférieure. Près de Viège (Frey).

**Ianthinana** Dup. IX, 248, 1. Lediana Hw., Incisana HS.

Ch. en août et septembre dans les fruits de l'aubépine. Pap. en juin et juillet. Pas commun. Dans la région des arbres à feuilles. Martigny, Fully, Sion, Sierre, Viège, Brigue, Salquenen.

**Gen. Parmene Hb. 1818 (Phthoroblastis Ld.)**

**Fimbriana** Hw. Lep. Br. p. 446.

Ch. en automne et au printemps dans le bois pourri du chêne. Pap. en avril et mai. Pas commun. Dans la région inférieure. Sierre.

**Argyrana** Hb. 46. Atromargana Wd., Lathyrana Dup.

Ch. en automne et au printemps dans la mousse qui recouvre les souches du chêne. Pap. en avril et juin. Pas rare. Dans la région du chêne. Plan-Cerisier, Branson-Follatères, Sierre, Naters.

**Splendidulana** Gn. Ind. 45. Plumbatana Z.

Ch. d'août en avril suivant dans les faînes du hêtre et les glands du chêne. Pap. d'avril en juin. Rare. Région forestière inférieure. Plan-Cerisier, M<sup>t</sup> Chemin.

**Gallicolana** Z. Is. 1846, 255. Albuginana Gn.

Ch. dans les galles qui se trouvent sur les feuilles du chêne. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Dans la région du chêne. Haut-Valais (A.); Follatères.

a) **var. Amygdalana** Dup. Sup. IV, 63. 6. Ailes antérieures ferrugineuses, avec la dorsale ondulée de jaune sans tache blanche.

Avec le type.

**Spiniana** Dup. IV, 66, 7. Ehippana Wd.

Ch. inconnue. Pap. en septembre. Très rare. Région inférieure. Un seul ex. de Salquenen en 1904 (de R.).

**Regiana** Z. Stett. e. Z. 1849, 279. Trauniana Hw. 444.

Ch. en automne et au printemps sous l'écorce de l'*Acer pseudoplatanus* et du *platanoides*. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la région inférieure. Haut-Valais (A.); Sion, Sierre.

**Trauniana** Schiff. S. V. 132. Floricolana Hb., Conjugana Z.

Ch. en automne et au printemps sous l'écorce de l'*Acer campestre*. Pap. en mai et juin. Rare. Haut-Valais (A.); M<sup>t</sup> Chemin.

**Flexana** Z. Stett. e. Z. 1849, 281. Vigeliana HS.

Ch. en septembre sur *Fagus*, entre deux feuilles liées par des fils de soie. Pap. en mai et juin. Rare. Région forestière. Haut-Valais (A.), M<sup>t</sup> Chemin.

**Purpureana** Const. An. S. Fr. 1888 p. 169, t. 4, f. 8.

Ch. inconnue. Pap. en mai et juin. Très rare. Dans la région du chêne. Au-dessus de Plan-Cerisier.

**Rhediella** Cl. Ic. 12, 12. Aurana Hb., Daldorfiana Hw.

Ch. de juillet en septembre dans les fruits de *Cratægus*, *Prunus Cerasus* et *domestica*, *Pirus Malus*, etc. Pap. en mai et juin. Pas rare. Dans la région des arbres fruitiers. Haut-Valais (A.) ; Sion, Sierre.

### **Gen. Tmetocera Ld. 1859.**

**Ocellana** F. Mant. II, 228. Luscania F., Comitana Hb.

Ch. sur *Alnus*, *Cratægus*, *Sorbus Aucuparia*, *Larix*, *Pirus Malus*, etc. Pap. de juin en août. Assez rare. Dans la région forestière. Haut-Valais (A.) ; Martigny, La-Croix, Sion, Sierre, Salquenen, près de Bérisal.

a/ **var. Lariciana** Hein. 206. Zellerana Borg. Plus petit, ailes plus étroites, les antérieures plus ou moins sablées de plomb foncé. Un ex. du Valais : Binn ou Gruben ? (de R.).

Obs. M. de Rougemont trouve que c'est à tort qu'on a fait de ce papillon une simple var. du précédent.

**Pomonella** L. S. N. X, 538. Pomonana Schiff.

Ch. en automne dans les poires et les pommes. Pap. de mai en juillet. Commun dans la région des arbres fruitiers. Martigny, Fully, La Croix, Sion, Sierre, Viège, Salquenen.

**Grossana** Hw. Lep. Br. p. 438. Fagiglandana Z.

Ch. en automne dans les faines du hêtre. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Dans la région forestière. M<sup>t</sup> Chemin.

**Splendana** Hb. 31.

Ch. en automne dans les glands du chêne. Pap. en juin et juillet. Pas commun. Région chaude inférieure. Haut-Valais (A.); Follatères, Mt Ravoire, Sierre.

a/ **var. Reaumurana** Hein. 195. Variable, le plus souvent avec les ailes antérieures couleur de plomb foncé.

Ch. dans les châtaignes en automne. Pap. en juin et juillet. Pas rare dans le Bas-Valais : Vouvry, Monthey, Fully, Martigny.

**Amplana** Hb. 24.

Ch. en août et en septembre dans les noix et les noisettes. Pap. en juin et juillet. Pas rare, dans la région du noyer : Martigny, Fully, Sion, Sierre, Viège, Naters.

**Gen. Ancylis** Hb. 1818 (**Phoxopteryx** Tr.).

**Derasana** Hb. 206. *Unculana*. Wd.

Ch. en juillet, puis en septembre sur *Cornus sanguinea*, *Prunus spinosa*, *Rhamnus Frangula*, *Vaccinium Myrtillus*, etc. Pap. en mai et juin; puis en août. Rare. Haut-Valais (A.); environs de Sion, Salquen.

**Lundana** F. Gen. p. 294. *Corylana* Hb., *Badiana* Dup.

Ch. en mai et juin, puis en août et septembre sur *Orobus niger*, *Trifolium pratense*, *Vicia sepium*, etc. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Pas rare. Plaine et région montagneuse jusqu'à 1600 m. Sur le Simplon (Bent.); Plan-Cerisier, Branson, environs de Sierre.

**Myrtillana** Tr. VIII, 245. *Derasana* Wd., *Dentata* Lah.

Ch. au printemps sur *Vaccinium Myrtillus* et *uliginosum*. Pap. de mai en juillet. Pas commun. Sous-alpes et alpes jusqu'à 2000 m. La Forclaz, Bovine, Arpillen (W. et F.); Saillon (de R.).

**Siculana** Hb. 79. *Aspicella* Hein.

Ch. en avril et mai, puis en juillet et août sur *Rhamnus Frangula*, *Ligustrum*, *Cornus*, etc. Pap. en mai et juin, puis en août et septembre. Pas rare. Dans les prairies de la région forestière. Au-dessus d'Aigle (Lah.) ; Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier, Salquenen.

**Selenana** Gn. Ind. 36. *Curvana* Z.

Ch. inconnue. Pap. en avril et mai. Rare. Haut-Valais (A.).

**Comptana** Fröl. En. Tort. N<sup>ro</sup> 242. *Cuspidana* West.

Ch. en juin et juillet, puis en septembre sur *Dryas octopetala*, *Helianthemum vulgare*, *Potentilla*, *Teucrium Chamædrys*, *Thymus*, etc. Pap. en avril et mai, puis en juillet et août. Pas commun. Plaine et région montagneuse jusqu'à 2000 m. et plus. Zermatt, M<sup>t</sup> Ravoire, Plan-Cerisier, Branson, Salquenen.

*a/* **var. Incomptana** Lah. Tort. p. 110. Ailes antérieures plus allongées à l'apex et la bande blanche plus distincte.

Haut-Valais (A.), Salquenen.

**Unguicella** L. S. N. X, 536. *Falcana* Hb., *Fractifasciana* Steph.

Ch. en automne et au printemps sur *Calluna vulgaris*. Pap. d'avril en juin ; il varie considérablement quant aux dessins plus ou moins distincts. Il vole en général en grand nombre là où il se trouve, surtout dans les forêts claires où croissent en abondance les aireselles et les bruyères. Plaine et région montagneuse jusqu'à 1800 m. Haut-Valais (A.) ; Viège et Simplon (Bent.) ; La Forclaz, M<sup>t</sup> Ravoire, M<sup>t</sup> Chemin, Sierre, Salquenen.

**Uncana** Hb. 76. *Uncella* Hein.

Ch. comme la précédente. Pap. d'avril en juin. Rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.) ; M<sup>t</sup> Chemin.

**Biarcuana** Steph. Cat. II, 178. *Fluctigerana* HS.

Ch. peut-être sur les saules et les osiers. Pap. en mai et juin. Très rare. Du Valais, sans souvenance de la localité (de R.).

**Mitterbacheriana** Schiff. S. V. p. 129. *Retusana* Wd.

Ch. en automne et au printemps sur le chêne, le hêtre, le noisetier, etc. Pap. en avril, mai et juin. Assez commun. Dans la région des arbres à feuilles. Haut-Valais (A.) ; au-dessus de Plan-Cerisier, M<sup>t</sup> Chemin, Salquenen.

**Lætana** F. S. E. 649, N<sup>ro</sup> 20. *Harpana*. Hb.

Ch. en automne et au printemps sur le tremble. Pap. de mai en juillet. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Haut-Valais (A.) ; M<sup>t</sup> Chemin.

### **Gen. Rhopobota Ld. 1859.**

**Nævana** Hb. 261. *Unipunctana* Hw.

Ch. polyphage, en mai et juin, sur *Prunus*, *Vaccinium*, *Sorbus*, *Cratægus*, etc. Pap. en juillet et août. Commun dans les taillis de la région inférieure. Au-dessus d'Aigle (Lah.) ; Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny.

### **Gen. Dichrorampha Gn. 1845 (Hermimene**

**[Hb.] Meyr).**

**Petiverella** L. S. N. X p. 540. *Montana* Hb.

Ch. en automne et au printemps dans les racines de *Tanacetum* et *Achillea millefolium*. Pap. pendant toute la belle saison. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1600 m. Près de Zermatt (Frey) ; environs de La Croix (F.) ; Stalden (de R.).



**Alpinana** Tr. VIII, 230. Strigana Hw., Politana Gn.

Ch. comme la précédente. Pap. de mai en août. Assez rare. Plaine et sous-alpes jusqu'à 1700 m. Près de Zermatt (Frey) ; M<sup>t</sup> Chemin, Martigny (F.) ; vallée de Binn (de R.).

**Simpliciana** Hw. Lep. Br. p. 444. Caliginosana Tr.

Ch. en automne et au printemps dans les racines de l'*Artemisia campestris*. Pap. de juin en août. Rare. Dans la région inférieure. Près de Viège (B.).

**Ligulana** HS. 279, IV p. 260. Plusiana Stgr.

Ch. inconnue. Pap. pendant tout l'été. Rare. Dans les forêts de mélèzes de la région alpine. Haut-Valais (Lah., A.) ; sur le Simplon (Bent.) ; La Forclaz (F.).

**Rhæticana** Frey, Lep. 331.

Ch. inconnue. Pap. en juin et juillet. Rare. Dans la haute région alpine, à plus de 2100 m. Haut-Valais (A.).

**Harpeana** Frey, Mitth. III, 1870 p. 246. ? Chavanneana Lah.

Ch. inconnue, probablement sur *Rhamnus pumila*.

Pap. en juillet et août. Rare. Dans les alpes élevées. Zermatt, Gornergrat (Frey).

**Plumbagana** Tr. VIII, 218. Salicetana Pritt.

Ch. en automne et au printemps dans les racines et les tiges de *Tanacetum vulgare* et *Achillea millefolium*. Pap. de mai en août. Rare. Haut-Valais (A.) ; Salquenen (de R.).

### **Gen. Lipoptycha Ld. 1859.**

**Bugnioniana** Dup. Sup. IV, 83, 11.

Ch. inconnue. Pap. en juillet et août. Rare. Dans les endroits humides des alpes élevées du Valais jusqu'à 2500 m. Haut-Valais).

**Gruneriana** HS. 261-2, IV p. 256.

Ch. en automne et au printemps sur *Anthemis*, dans la tige au-dessus des racines. Pap. en mai et juin. Rare. Bex (Lah.) ; Haut-Valais (A.).

**Plumbana** Sc. Ent. Carn. N<sup>ro</sup> 592. Zachana Tr., Ulicana Gn.

Ch. en automne et au printemps dans les racines de l'*Artemisia vulgaris* et du *campestris*. Pap. pendant toute la belle saison. Assez commun dans la plaine et les sous-alpes. Haut-Valais (A.) ; environs de Martigny (F.) ; Salquenen (de R.).  
(A suivre.).

---